

POSOLOGIA:

SORAFENIB se administra por **vía oral**.

La dosis recomendada es según prescripción médica.



¿CÓMO se debe TOMAR Sorafenib?

- Debe tomarlo sin alimentos, es decir, 1 hora antes o dos horas después de comer.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlas.
- Mantenga siempre el mismo horario.

¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis: tómela lo antes posible. Si han transcurrido más de 6 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de 30 minutos desde la toma.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

CUANDO NO debe tomar Sorafenib?

- Si usted es alérgico a sorafenib, así como a cualquiera de los componentes de la cápsula.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.

PRECAUCIONES:

- Si tiene enfermedad hepática grave.
- Si ha sufrido alguna enfermedad que afecte de manera importante la absorción intestinal o si se ha sometido a una reducción quirúrgica de intestino o estómago.
- Si tiene problemas cutáneos, es hipertenso o se ha sometido a una intervención quirúrgica.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada y manténgalas hasta 2 semanas después de haber finalizado el tratamiento.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.
- Se recomienda usar gel de baño sin detergente, cremas hidratantes de avena o aloe vera y champú suave.
- Protéjase del sol con ropa adecuada y crema con filtro solar de protección superior a 15.

INTERACCIONES:

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antifúngicos (para tratar infecciones por hongos): ketoconazol, itraconazol, voriconazol,
- Antibióticos: telitromicina, claritromicina, eritromicina, rifampicina.
- Antiepilépticos: fenobarbital, fenitoína, carbamazepina.
- Antiulcerosos: omeprazol, ranitidina.
- Anticoagulantes: acenocumarol, warfarina.
- Otros: digoxina, dexametasona,
- Hierba de San Juan o hipérico.
- Zumo de pomelo

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Erupciones cutáneas, rash, sequedad de la piel, especialmente manos y pies.
- Náuseas y vómitos
- Diarrea, estreñimiento.
- Caída del pelo
- Cansancio, fatiga
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Disminución del apetito
- Dolor de cabeza
- Hipertensión: se recomienda controlar la presión arterial las primeras semanas de tratamiento.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Dificultad para respirar, ansiedad, dolor en el pecho, sudor frío.
- Cefalea intensa
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga las cápsulas en su envase original, a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento solo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán evitar el contacto con el contenido de las cápsulas.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

| DIAS | Nº CÁPSULAS | | Frecuencia |
|------|-------------|-----|------------|
| | 9h | 21h | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

COMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

Logo Hospital



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



SORAFENIB

NEXAVAR®

Cápsulas de 200 mg

Nombre del paciente:

Fecha:

Diciembre 2010