

POSOLOGÍA

TALIDOMIDA se administra por **vía oral**.

La dosis recomendada es según prescripción médica.



¿CÓMO se debe TOMAR Talidomida?

- Debe tomarse antes de acostarse, al menos 1 hora después de cenar.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlas.
- Mantener siempre el mismo horario.

¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis tómela lo antes posible y no doble nunca la dosis.
- Si vomita no repita la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar Talidomida?

- Si usted es alérgico a talidomida así como a cualquiera de los componentes de la cápsula como lactosa.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.

PRECAUCIONES:

- Si tiene enfermedad hepática o renal grave
- Si ha padecido alguna enfermedad que afecte de manera importante la absorción intestinal o si se ha sometido a una resección quirúrgica de intestino o estómago.
- Evite el alcohol
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada y manténgalas hasta 4 semanas después de haber finalizado el tratamiento.
- Este medicamento es teratogénico y puede afectar al feto
- No puede donar sangre ni semen durante el tratamiento y hasta 4 semanas después de finalizar el tratamiento
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

INTERACCIONES:

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antibióticos: rifampicina, zalcitabina
- Antivirales: estavudina, didanosina.
- Antiepilépticos: fenitoina, carbamazepina.
- Medicamentos que produzcan somnolencia: ansiolíticos, antidepresivos, antihistamínicos, medicamentos para tratar el dolor o el insomnio.
- Otros: dexametasona, Equinacea.

EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Cansancio, somnolencia, mareos.
- Entumecimiento, hormigueo, dolor o inflamación de las manos o pies.
- Enrojecimiento y picor de la piel.
- Náuseas, vómitos, estreñimiento.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Dolor de garganta
- Dolor o inflamación de las piernas
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga las cápsulas en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento solo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de las cápsulas.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

COMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

Logo Hospital



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

TALIDOMIDA
THALIDOMIDE
PHARMION®
Cápsulas de 50 mg

Nombre del Paciente:

Fecha:

Diciembre 2010