

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral


Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)



Xaluprine 20 mg/ml Suspensión Oral (Mercaptopurina)

Suspensión oral 20 mg/ml (excipientes: aspartamo, hidroxibenzoato de metilo, hidroxibenzoato de etilo, sacarosa).

Conservación: lugar fresco, seco y protegido de la luz.



POSOLOGIA

Mercaptopurina suspensión oral se administrará por vía oral.

Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la frecuencia.

¿CÓMO se debe TOMAR Mercaptopurina?

Se recomienda tomar Mercaptopurina suspensión oral con el estómago vacío, al menos una hora antes o dos horas después de las comidas. Se recomienda administrarlo por la tarde o antes de acostarse.

Antes de medir la dosis prescrita debe agitar el frasco enérgicamente durante al menos 30 segundos.

Se debe beber agua después de la toma de mercaptopurina.

Evite tomar Mercaptopurina juntamente con leche u otros productos lácteos. Debe espaciar la toma del medicamento al menos 1 hora antes o 2 horas después.

Mantenga siempre el mismo horario.

Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.

¿QUÉ hacer si.....?

Si ha olvidado una dosis, adminístrela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no tome la dosis olvidada (nunca doble la dosis).

Si vomita, únicamente repita la dosis si se ha transcurrido menos de media hora desde la toma.

Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Instituto Nacional de Toxicológica (Tfno: 91 562 04 20).

En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

¿Cuándo NO debe tomar Mercaptopurina?

Si es alérgico a Mercaptopurina o Tioguanina así como a alguno de los componentes de la suspensión.

Este medicamento contiene aspartamo, puede ser perjudicial para personas con fenilcetonuria.

Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con el antes de tomar este medicamento.

PRECAUCIONES

Si tiene enfermedad hepática grave.

Si tiene enfermedad renal.

Si ha sufrido alguna enfermedad que afecte de manera importante a la absorción intestinal.

Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.

Mercaptopurina suspensión oral puede interactuar con alopurinol, anticoagulantes orales y vacunas.

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante la toma de Mercaptopurina (que no significa que aparezcan en todos los pacientes) son:

- Cansancio
- Náuseas y vómitos
- Dolores musculares y de articulaciones
- Erupción cutánea (puede empeorar con la exposición al sol)
- Micción dolorosa
- Llagas en la boca
- Pérdida de cabello
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias (sangrado), tenga cuidado con utensilios que corten

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. Una vez abierto el frasco caduca a los 56 días.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Esta medicación puede adquirirse en la Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico especialista.

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

REFERENCIAS

- Ficha técnica de Xaluprine®. Disponible en: http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002022/WC500124645.pdf. Consultado el 10 de octubre de 2013.
- Micromedex 2.0 [base de datos en Internet]. MICROMEDEX DRUGDEX® System. 2012-2013 Truven Health Analytics Inc. Disponible en: <http://www.micromedexsolutions.com/home/dispatch>. Consultado el 9 de septiembre de 2013.
- UptoDate®. (Base de datos en internet). Pediatric Drug Information Lexicomp®. Wolters Kluwer Health Clinical Solutions 2013. Disponible en: <http://www.uptodate.com>. Consultado el 9 de septiembre de 2013.
- Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. Pediamécum. Edición 2012. Mercaptopurina. Disponible en: <http://www.pediamecum.es>. Consultado el 9 de septiembre de 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN/ FECHA DE REVISION

Octubre 2013/Febrero 2014