

CONSERVACIÓN

(¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva Anagrelide cápsulas en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad (guárdalas en un lugar seco)



CADUCIDAD

(¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en el envase.

ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en las Oficinas de Farmacia, con la receta que te hará tu médico especialista o en el Servicio de Farmacia del Hospital.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



XAGRID® (Anagrelida)

Cápsulas duras de 0,5 mg

Caja con 100 cápsulas duras

Conservación: Conservar a temperatura ambiente



Anagrelida cápsulas se toma por vía oral (por la boca).

Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR?

- Anagrelide cápsulas puede tomarse con o sin alimentos (antes o después de las comidas).
- Evita el contacto de la medicación con la piel. Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.
- Debes tragar las cápsulas enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar la cápsula en la boca, ni disolverlas.
- Si necesitas abrir la cápsula, debes leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.

Toma la medicación siempre a la misma hora.

¿QUÉ hacer si.....?



Si has olvidado tomar una dosis, tómala lo antes posible. Si ya ha pasado más de 12 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.

Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado la cápsula, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.



Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico

Si eres alérgico a Anagrelide, así como a alguno de los componentes de la cápsula.

Este medicamento contiene **lactosa**. Si tu médico te ha dicho que tienes intolerancia a ciertos azúcares, consúltale antes de tomar este medicamento.

PRECAUCIONES

- Si tienes enfermedad hepática grave (enfermedad del hígado)



- Si tienes enfermedad renal (enfermedad del riñón)
- Si tienes una enfermedad del corazón moderada o grave
- Si has sufrido alguna enfermedad que afecte de manera importante a la absorción intestinal.

intestinal.

- Consulta con tu médico o farmacéutico antes de vacunarte.
- Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento.

INTERACCIONES



Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.

Anagrelide cápsulas puede interactuar con algunos medicamentos (ácido acetilsalicílico, fluvoxamina, milrinona, omeprazol, teofilina, sucralfato, zumo de pomelo) por eso es importante que antes de empezar cualquier tratamiento nuevo lo consultes con tu médico.

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer) :



- Cansancio.
- Dolor de cabeza, mareos, sueño.
- Náuseas, diarrea.
- Palpitaciones.
- Retención de líquidos.
- Erupciones en la piel y cambio del color.
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias.

Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntaselo a tu médico o farmacéutico.

Avisa rápidamente a tu médico si tienes

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces muy oscuras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Signos cardiacos y respiratorios como ansiedad, sudor frío, palpitaciones, dolor en el pecho, mareo, dificultad para respirar.
- Dolor de cabeza intenso.
- En caso de sobredosis.