

CONSERVACIÓN

(¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva Busulfano comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad (guárdalas en un lugar seco)



CADUCIDAD

(¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en el envase.

ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en las Oficinas de Farmacia, con la receta que te hará tu médico especialista o en el Servicio de Farmacia del Hospital.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



BUSULFANO 2 mg COMPRIMIDOS

Comprimidos recubiertos de 2 mg

Caja con 100 comprimidos

Conservación: Mantenga las cápsulas en su envase original a temperatura ambiente, protegido de la luz y de la humedad.



Busulfano comprimidos se toma por vía oral (por la boca).
Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR?



• Busulfano comprimidos puede tomarse con o sin alimentos (antes o después de las comidas).

• Evita el contacto de la medicación con la piel. Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.

• Debes tragar los comprimidos enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar el comprimido en la boca, ni disolverlo.

• Si necesitas partir el comprimido, debes leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.

Toma la medicación siempre a la misma hora.

¿QUÉ hacer si.....?



Si has olvidado tomar una dosis, tómala lo antes posible. Si ya ha pasado más de 12 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.

Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado el comprimido, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.



Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico

Si eres alérgico a Busulfano, así como a alguno de los componentes del comprimido.

Este medicamento contiene **lactosa**. Si tu médico te ha dicho que tienes intolerancia a ciertos azúcares, consúltale antes de tomar este medicamento.

PRECAUCIONES

• Si tienes alguna enfermedad respiratoria, del corazón o del hígado.



• Si has tenido previamente convulsiones o traumatismos craneales.

• Consulta con tu médico o farmacéutico antes de vacunarte.

• Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento.


INTERACCIONES



Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.

Busulfano comprimidos puede interaccionar con algunos medicamentos (fenitoína, itraconazol, metronidazol, natalizumab, paracetamol, pimecrolimus, roflumilast, tacrólimus tópico, tioguanina) por eso es importante que antes de empezar cualquier tratamiento nuevo lo consultes con tu médico.

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer) :



• Edema (acúmulo, retención de líquidos), hipertensión, taquicardia

• Erupción, enrojecimiento, picor de la piel (que normalmente empieza en palmas de las manos o plantas de los pies).

• Estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, estomatitis (enrojecimiento, irritación, úlceras en la boca), anorexia, náuseas o vómitos.

• Mareo, dolor de cabeza, insomnio, ansiedad.

• Tos, rinitis, fiebre, dolor, temblores, escalofríos.

• Sangrado o moratones.

Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntaselo a tu médico o farmacéutico.

Avisa rápidamente a tu médico si tienes

• Dificultad para respirar con tos, fiebre, dolor de garganta.

• Sangrado o moratones.

• Debilidad, fatiga, cansancio, anorexia, pérdida de peso, náuseas o vómitos.