

CONSERVACIÓN

(¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva la suspensión oral de busulfano en la nevera.



CADUCIDAD

(¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en el etiqueta identificativa de la fórmula magistral (30 días)

ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en el Servicio de Farmacia del Hospital con la receta que te hará tu médico especialista (fórmula magistral).

RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



BUSULFANO suspensión oral (fórmula magistral)

Suspensión oral 2 mg/mL (Contiene jarabe simple).

Conservación: nevera (2-8°C) en su envase original y protegido de la luz.

Caducidad: 30 días



Busulfano suspensión se toma por vía oral (por la boca).

Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR?



- Puedes tomar Busulfán suspensión con o sin alimentos (antes o después de las comidas).
- Agita la suspensión antes de coger la dosis prescrita.
- Evita el contacto de la medicación con la piel. Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.
- Toma la medicación siempre a la misma hora.

¿QUÉ hacer si.....?



Si has olvidado tomar una dosis, tómala lo antes posible. Si ya ha pasado más de 12 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.

Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado la suspensión, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.



Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico.

Si eres alérgico a Busulfano, así como a alguno de los componentes del comprimido.

Este medicamento contiene **lactosa**. Si tu médico te ha dicho que tienes intolerancia a ciertos azúcares, consúltale antes de tomar este medicamento.

PRECAUCIONES

- Si tienes alguna enfermedad respiratoria, del corazón o del hígado.
- Si has tenido previamente convulsiones o traumatismos craneales.
- Consulta con tu médico o farmacéutico antes de vacunarte.
- Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento.



INTERACCIONES

Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.



Busulfano suspensión puede interactuar con algunos medicamentos (fenitoína, itraconazol, metronidazol, natalizumab, paracetamol, pimecrolimus, roflumilast, tacrólimus tópico, tioguanina) por eso es importante que antes de empezar cualquier tratamiento nuevo lo consultes con tu médico.

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer) :



- Edema (acúmulo, retención de líquidos), hipertensión, taquicardia
- Erupción, enrojecimiento, picor de la piel (que normalmente empieza en palmas de las manos o plantas de los pies).
- Estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, estomatitis (enrojecimiento, irritación, úlceras en la boca), anorexia, náuseas o vómitos.
- Mareo, dolor de cabeza, insomnio, ansiedad.
- Tos, rinitis, fiebre, dolor, temblores, escalofríos.
- Sangrado o moratones.

Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntaselo a tu médico o farmacéutico.

Avisa rápidamente a tu médico si tienes

- Dificultad para respirar con tos, fiebre, dolor de garganta.
- Sangrado o moratones.
- Debilidad, fatiga, cansancio, anorexia, pérdida de peso, náuseas o vómitos.