

CONSERVACIÓN

(¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva Celecoxib cápsulas en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad (guárdalas en un lugar seco)



CADUCIDAD

(¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en el envase.

ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en las Oficinas de Farmacia, con la receta que te hará tu médico especialista.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



CELEBREX® (Celecoxib)

Cápsulas duras de 100 y 200 mg

Caja con 30 cápsulas

Conservación: Conservar en su envase original, a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.



Celecoxib cápsulas se toma por vía oral (por boca)
Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR?



- Celecoxib cápsulas se tomará preferiblemente con algo de comida para reducir las posibles molestias gastrointestinales que pueden aparecer cuando tomes esta medicación. Evita tomar comidas demasiado grasas.

- Evita el contacto de la medicación con la piel.

- Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.
- Debes tragar las cápsulas enteras con un vaso de agua, sin masticar ni chupar la cápsula en la boca, ni disolverla.
- Si necesitas manipular la cápsula, debes leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.
- Toma la medicación siempre a la misma hora.

¿QUÉ hacer si.....?



Si has olvidado tomar una dosis, tómala lo antes posible. Si ya ha pasado más de 12 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.

Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado la cápsula, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.



Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico

Si eres alérgico a Celecoxib o a las Sulfonamidas, así como a alguno de los componentes de la cápsula.

Este medicamento contiene lactosa. Si tu médico te ha dicho que tienes intolerancia a ciertos azúcares, consúltale antes de tomar este medicamento

Si has tenido una reacción alérgica con la aspirina o algún antiinflamatorio no esteroideo, consulta a tu médico o farmacéutico antes de tomar celecoxib.



PRECAUCIONES

- Si tienes una enfermedad cardíaca (del corazón)
- Si tienes una enfermedad hepática (del hígado) o renal (del riñón)
- Si tienes antecedentes de hipertensión (tensión en las arterias elevada), retención de líquidos, edemas o eventos cardiovasculares.
- Si tienes una úlcera o sangrado gastrointestinal.
- Si tienes asma.
- Si tienes artritis idiopática juvenil sistémica.
- Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento.

INTERACCIONES



Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.

Celecoxib puede interactuar con algunos medicamentos (warfarina, antiinflamatorios no esteroideos, fármacos antihipertensivos, ciclosporina y tacrolimus), por eso es importante que antes de empezar cualquier tratamiento nuevo consultes con tu médico.

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer) :



- Hipertensión (aumento de la presión arterial).
- Nauseas o diarrea.
- Dolor de cabeza.
- Broncoespasmo (dificultad respiratoria).
- Reacción alérgica.

Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntaselo a tu médico o farmacéutico.