

CONSERVACIÓN

(¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva la suspensión oral de clorambucilo en la nevera y protegido de la luz.



CADUCIDAD

(¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en la etiqueta identificativa de la fórmula magistral.

ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en el Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que te hará tu médico especialista (Fórmula Magistral).

RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



CLORAMBUCILO suspensión oral (fórmula magistral)

Suspensión oral 2 mg/mL (Contiene jarabe simple y metilcelulosa)

Conservación: nevera (2-8°C), en su envase original y protegido de la luz

Caducidad: 7 días



Clorambucilo suspensión se toma por vía oral (por la boca).

Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR?



- Debes tomar Clorambucilo suspensión con el estómago vacío, 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. Evita las comidas ácidas, picantes o especiadas.

- Agita la suspensión antes de coger la dosis prescrita.

- Evita el contacto de la medicación con la piel. Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.

- Toma la medicación siempre a la misma hora.

¿QUÉ hacer si.....?



Si has olvidado tomar una dosis, tómala lo antes posible. Si ya ha pasado más de 12 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.

Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado la suspensión, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.



Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico

Si eres alérgico a Clorambucilo o a otros agentes alquilantes (consulta a tu médico).

Este medicamento contiene **sacarosa**. Si tu médico te ha dicho que tienes intolerancia a ciertos azúcares, consúltale antes de tomar este medicamento.

PRECAUCIONES



- Si padeces crisis convulsivas o tomas medicamentos que pudieran producirlas.

- Si has padecido un traumatismo craneoencefálico.

- Si tienes una enfermedad relacionada con el hígado o el riñón.

- Consulta con tu médico o farmacéutico antes de vacunarte.

- Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento.

INTERACCIONES



Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.

Clorambucilo suspensión oral puede interactuar con algunos medicamentos por eso es importante que antes de empezar cualquier tratamiento nuevo lo consultes con tu médico.

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer) :



- Rash cutáneo (enrojecimiento de la piel), picor e hinchazón.

- Dolor abdominal, diarrea, anorexia, náuseas y vómitos.

- Mioclonías (movimientos involuntarios, breves, bruscos), neuropatía periférica (hormigueo, dolor muscular), debilidad.

- Convulsiones, agitación, confusión.

- Ataxia (falta de coordinación de movimientos), fatiga, fiebre, alucinaciones, irritabilidad, hiperactividad.

Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntaselo a tu médico o farmacéutico.

Avisa rápidamente a tu médico si tienes

- Erupción cutánea grave con formación de ampollas, descamación de la piel, fiebre.

- Dificultad para respirar.

- Dolor e inflamación de piernas., especialmente en la parte inferior y pantorrilla.

- Fiebre alta > 38 °C, escalofríos (signos de infección).

- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.