

CONSERVACIÓN

(¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva Lomustina cápsulas, en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad (guárdalas en un lugar seco).



CADUCIDAD

(¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en el envase.

ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en el Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que te hará tu médico especialista.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria



CeeNU 100 mg (Lomustina)

Capsulas 100 mg

Conservación: Mantenga las cápsulas en su envase original a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.



Lomustina cápsulas se toma por vía oral (por la boca).

Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR?

- Lomustina cápsulas debe tomarse con el estómago vacío. Se recomienda no ingerir alimentos ni beber líquidos desde una hora antes hasta dos horas después.



- Evita el contacto de la medicación con la piel. Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.
- Debes tragar las cápsulas enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar las cápsulas. Si tienes problemas para tragar, puedes abrir las cápsulas y dispersar el contenido en una pequeña cantidad de zumo de manzana, yogur o helado.
- Si necesitas abrir las cápsulas, debes leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales
- Toma la medicación siempre a la misma hora.

¿QUÉ hacer si.....?

Si has olvidado tomar una dosis, tómala lo antes posible. Si ya ha pasado más de 12 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.



Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado la cápsula, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.



Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico

Si eres alérgico a Lomustina, así como a alguno de los componentes de la cápsula.

PRECAUCIONES



- Si tienes una enfermedad hepática (del hígado).
- Si tienes una enfermedad renal (del riñón).
- Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento.

INTERACCIONES

Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.



Lomustina cápsula puede interactuar con algunos medicamentos (antiasmáticos (teofilina), antiepilépticos (fenobarbital) y otros fármacos como cimetidina o aspirina) por eso es importante que antes de empezar cualquier tratamiento nuevo lo consultes con tu médico.

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer) :



- Náuseas, vómitos.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debes tomar medidas higiénicas (lavado de manos).
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias (sangrado por la nariz, hematomas).
- Disminución del apetito.
- Pérdida de peso.
- Llagas en la boca.

Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntaselo a tu médico o farmacéutico.

Avisa rápidamente a tu médico si tienes

- Dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel (reacción alérgica grave).
- Fiebre alta > 38 °C, escalofríos (signos de infección).
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.