

## CONSERVACIÓN

### (¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva Imatinib comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad (guárdalas en un lugar seco).



## CADUCIDAD

### (¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en el envase.

## ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en el Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que te hará tu médico especialista.

## RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



## COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

## PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



### GLIVEC 100 mg (Imatinib)

Comprimidos recubiertos de 100 mg

Caja con 60 comprimidos

**Conservación:** Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.



Imatinib comprimidos se toma por vía oral (por la boca).

Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR?



- Se recomienda la administración de Imatinib comprimidos con alimentos (ayudará a proteger tu estómago).
- Evita el contacto de la medicación con la piel. Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.
- Debes tragar los comprimidos enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar el comprimido en la boca. Si no puedes tragar el comprimido con facilidad, puedes disolverlo en medio vaso de agua o en zumo de manzana (disuélvelo y tómallo inmediatamente).
- Si necesitas partir el comprimido, debes leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.
- Toma la medicación siempre a la misma hora.

¿QUÉ hacer si.....?



Si has olvidado tomar una dosis, tómalo lo antes posible. Si ya ha pasado más de 12 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.

Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado el comprimido, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.



Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico

Si eres alérgico a Imatinib, así como a alguno de los componentes del comprimido.

PRECAUCIONES



- Si tienes alguna enfermedad relacionada con el hígado.
- Si tienes alguna enfermedad que afecte a la absorción intestinal.
- Consulta con tu médico o farmacéutico antes de vacunarte.
- Es recomendable que uses geles de baño sin detergente, cremas hidratantes de avena o aloe vera y champú suave.
- Mientras estés en tratamiento con Imatinib, usa cremas solares para protegerte del sol, con filtros de protección superior a 15.
- Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento.

INTERACCIONES

Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.



Imatinib comprimidos puede interactuar con algunos medicamentos (tratamientos usados en las infecciones, epilepsia y/o coagulación. Corticoides, paracetamol a dosis altas, tiroxina, estatinas), Hierba de San Juan, Zumo de Pomelo. Por eso es importante que antes de empezar cualquier tratamiento nuevo lo consultes con tu médico.

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer) :



- Dolor de cabeza
- Náuseas, vómitos, diarrea, indigestión.
- Erupción, calambres musculares, dolor muscular y óseo. Inflamación de las articulaciones.
- Cansancio, aumento de peso. Edema, retención de líquidos.

Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntaselo a tu médico o farmacéutico.

Avisa rápidamente a tu médico si tienes

- Dificultad para respirar.
- Fiebre alta > 38 °C.
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.
- Aumento rápido de peso.