

CONSERVACIÓN

(¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva Gefitinib comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad (guárdalas en un lugar seco).



CADUCIDAD

(¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en el envase.

ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en el Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que te hará tu médico especialista.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



IRESSA 250 mg (Gefitinib)

Comprimidos 250 mg

Caja con 30 comprimidos

Conservación: Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.



Gefitinib comprimidos se toma por vía oral (por la boca).

Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR?

- Gefitinib comprimidos puede tomarse con o sin alimentos (antes o después de las comidas).



- Evita el contacto de la medicación con la piel. Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.

- Debes tragar los comprimidos enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar el comprimido en la boca, ni disolverlo. Si no puedes tragar el comprimido con facilidad, puedes dispersar el comprimido en medio vaso de agua. Agitar de vez en cuando el comprimido, sin tritararlo. Este proceso puede durar hasta 20 minutos. La dispersión debes beberla inmediatamente (en 1 hora como máximo desde la dispersión). Enjuaga el vaso con agua y bétetela.

- Si necesitas partir el comprimido, debes leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.
- Toma la medicación siempre a la misma hora.

¿QUÉ hacer si.....?



Si has olvidado tomar una dosis, tómala lo antes posible. Si ya ha pasado más de 12 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.

Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado el comprimido, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.



Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico

Si eres alérgico a Gefitinib, así como a alguno de los componentes del comprimido.

Este medicamento contiene lactosa. Si tu médico te ha dicho que tienes intolerancia a ciertos azúcares, consúltale antes de tomar este medicamento.

PRECAUCIONES

- Si tienes alguna enfermedad relacionada con el hígado.
- Si tienes alguna enfermedad relacionada con el riñón.



- Si tienes alguna enfermedad relacionada con el pulmón.
- Si tienes alguna afectación a nivel ocular (del ojo).
- Consulta con tu médico o farmacéutico antes de vacunarte.

- Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento.

INTERACCIONES

Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.



Gefitinib comprimidos puede interactuar con algunos medicamentos (anticoagulantes orales, protectores gástricos, metoprolol, vinorelbina, antiepilépticos, antidepresivos, antibióticos y antifúngicos) por eso es importante que antes de empezar cualquier tratamiento nuevo lo consultes con tu médico.

Avisa a tu médico si estas tomando protectores gástricos, inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, pantoprazol) o antagonistas-H2 (ranitidina)

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer) :



- Diarrea, náuseas y vómitos.
- Alteraciones de la piel con inflamación y picor.
- Alteraciones del hígado. Puede aparecer una coloración amarillenta en tu piel, en los ojos.

- Neumonía (infección del pulmón en la que puede aparecer fiebre, malestar general, dolor muscular, cansancio, dolor de cabeza)

- Conjuntivitis, inflamación de los párpados, sequedad de ojos.

- Puede caerse el pelo.

- Falta de apetito, debilidad.

Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntaselo a tu médico o farmacéutico.

Avisa rápidamente a tu médico si tienes

- Dificultad para respirar con tos, fiebre, dolor de garganta.
- Sangrado o moratones.
- Debilidad, fatiga, cansancio, anorexia, pérdida de peso, náuseas o vómitos.