

CONSERVACIÓN

(¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva Melfalan comprimidos en su envase original, en la nevera, entre 2 y 8°C, protegidas de la luz y de la humedad (guárdalas en un lugar seco).



CADUCIDAD

(¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en el envase.

ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en una oficina de farmacia comunitaria, con la receta que te hará tu médico especialista.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



MELFALAN Aspen (Melfalan)

Comprimidos 2 mg

Caja con 50 comprimidos

Conservación: Mantén los comprimidos en su envase original, en nevera (2^a-8^aC), protegidos de la luz y de la humedad.



Melfalan comprimidos se toma por vía oral (por la boca).

Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR?



- Melfalan comprimidos debe tomarse con el estómago vacío, 1 hora antes o 2 horas después de una comida, con un vaso de agua.
- Evita el contacto de la medicación con la piel. Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.
- Debes tragar los comprimidos enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar el comprimido en la boca, ni disolverlo.
- Si necesitas partir el comprimido, debes leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.
- Toma la medicación siempre a la misma hora.

¿QUÉ hacer si.....?



Si has olvidado tomar una dosis, tómala lo antes posible. Si ya ha pasado más de 12 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.

Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado el comprimido, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.



Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico

Si eres alérgico a Melfalan, así como a alguno de los componentes del comprimido.

Si se presenta un efecto adverso denominado supresión grave de la médula ósea (disminución importante del número de plaquetas, glóbulos rojos y blancos).

PRECAUCIONES



- Si tienes una enfermedad renal (del riñón).
- Si tienes supresión de la médula ósea (trombocitopenia, neutropenia, anemia). Para controlar estos efectos, se te realizarán recuentos sanguíneos frecuentes (mediante analíticas) y la dosis se deberá retrasar o ajustar la conforme a los resultados.
- Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento.

INTERACCIONES

Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.



Melfalan comprimidos puede interactuar con algunos medicamentos: ciclosporina, cisplatino, antiácidos (antihistamínicos H2, inhibidores de la bomba de protones), carmustina, digoxina, vacunas con virus vivos (rubeola, paperas, varicela, sarampión) por eso es importante que antes de empezar cualquier tratamiento nuevo lo consultes con tu médico.

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer) :



- Diarrea, náuseas y vómitos, llagas en la boca
- Infecciones, fiebre, escalofríos
- Enfermedad hepática, hepatitis
- Caída de pelo, erupción cutánea
- Dolor torácico
- Fatiga, cansancio
- Dolor muscular, dolor abdominal.
- Puede aumentar el riesgo de hematomas y hemorragias (sangrado), tenga cuidado con utensilios que corten.

Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntaselo a tu médico o farmacéutico.

Avisa rápidamente a tu médico si tienes

- Dificultad para respirar, tos, escalofríos.
- Fiebre alta > 38 °C.
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.