

## CONSERVACIÓN

### (¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva Mercaptopurina comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad (guárdalas en un lugar seco).



## CADUCIDAD

### (¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en el envase.

## ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en una oficina de farmacia comunitaria, con la receta que te hará tu médico especialista.

## RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



## COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

## PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



### Mercaptopurina Aspen 50 mg Comprimidos

Comprimidos 50 mg

Caja con 25 comprimidos

**Conservación:** Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.



Mercaptopurina comprimidos se toma por vía oral (por la boca).

Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

### ¿CÓMO SE DEBE TOMAR?



- Mercaptopurina comprimidos debe tomarse con el estómago vacío. Debes tomarlo al menos una hora antes de las comidas o dos horas después de comer. Se recomienda tomarlo por la tarde o antes de acostarte. Evita tomar Mercaptopurina junto con leche u otros productos lácteos (queso, yogur, helado).
- Evita el contacto de la medicación con la piel. Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.
- Debes tragar los comprimidos enteros con un vaso de agua, sin masticarlos ni chuparlos. Si tienes problemas para tragar, existe la posibilidad de que tu farmacéutico te elabore una fórmula magistral (suspensión oral).
- Si necesitas fraccionar el comprimido, debes leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.
- Toma la medicación siempre a la misma hora.

### ¿QUÉ hacer si.....?



Si has olvidado tomar una dosis, tómala lo antes posible. Si ya ha pasado más de 12 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.

Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado el comprimido, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.



Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico

Si eres alérgico a Mercaptopurina o Tioguanina, así como a alguno de los componentes del comprimido.

Este medicamento contiene lactosa. Si tu médico te ha dicho que tienes intolerancia a ciertos azúcares, consúltale antes de tomar este medicamento.

### PRECAUCIONES

- Si tienes una enfermedad hepática (del hígado).
- Si tienes una enfermedad renal (del riñón).
- Si has sufrido alguna enfermedad que afecte a la absorción intestinal.
- Consulta con tu médico o farmacéutico antes de vacunarte.
- Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento.



### INTERACCIONES

Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.



Mercaptopurina comprimidos puede interactuar con algunos medicamentos (alopurinol, anticoagulantes orales, vacunas) por eso es importante que antes de empezar cualquier tratamiento nuevo lo consultes con tu médico.

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer) :



- Cansancio.
  - Náuseas y vómitos.
  - Dolores musculares y de articulaciones.
  - Erupción cutánea (puede empeorar con la exposición al sol).
  - Dolor al orinar.
  - Llagas en la boca.
  - Pérdida de pelo.
  - Mayor susceptibilidad a tener infecciones. (Debes tomar medidas higiénicas).
  - Puede aumentar el riesgo de hemorragias (sangrado), ten cuidado con utensilios que corten
- Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntaselo a tu médico o farmacéutico.

### Avisa rápidamente a tu médico si tienes

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar).
- Signos de infección (tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar).
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.
- Ojos o piel amarillentos.
- Oscurecimiento de la orina o heces blanquecinas.