

CONSERVACIÓN

(¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva Dasatinib comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad (guárdalas en un lugar seco).



CADUCIDAD

(¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en el envase.

ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en el Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que te hará tu médico especialista.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



Sprycel 20 mg (Dasatinib)

Comprimidos 20 mg.

Caja con 56 comprimidos.

Conservación: Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.



Dasatinib comprimidos se toma por vía oral (por la boca).

Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR?



- Dasatinib comprimidos puede tomarse con o sin alimentos (antes o después de las comidas), por la mañana o por la noche.

- Evita el contacto de la medicación con la piel. Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.

- Debes tragar los comprimidos enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar el comprimido en la boca, ni disolverlo. Si tienes problemas para tragar los comprimidos puedes disolver la dosis en zumo de naranja natural o de manzana (15-30 ml de zumo, sin conservantes). Deja reposar durante 20 minutos, y cada 5 minutos agita el contenido del vaso. Tras esos 20 minutos, bebe el zumo inmediatamente. Enjuaga el vaso con un poco de agua y bébete el contenido.

- Si necesitas partir el comprimido, debes leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales

- Toma la medicación siempre a la misma hora.

¿QUÉ hacer si.....?



Si has olvidado tomar una dosis, tómalala lo antes posible. Si ya ha pasado más de 12 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.

Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado el comprimido, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.

Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico



Si eres alérgico a Dasatinib, así como a alguno de los componentes del comprimido.

Este medicamento contiene lactosa. Si tu médico te ha dicho que tienes intolerancia a ciertos azúcares, consúltale antes de tomar este medicamento

PRECAUCIONES

- Si tienes una enfermedad cardiaca (del corazón).
- Si tienes una enfermedad cardiovascular y pulmonar (pueden aparecer retención de líquidos, edemas).



- Usa geles de baño sin detergente, cremas hidratantes de avena o aloe vera y champú suave.

- Mientras estés en tratamiento con Dasatinib, protégete del sol con cremas con filtros de protección superior a 15.

- Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento.

INTERACCIONES

Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.



Dasatinib comprimidos puede interactuar con algunos medicamentos (itraconazol, eritromicina, claritromicina, ritonavir, dexametasona, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, rifampicina, omeprazol, famotidina, hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*)) por eso es importante que antes de empezar cualquier tratamiento nuevo lo consultes con tu médico.

Es importante la interacción Dasatinib con antagonistas de receptores de histamina-2 (ranitidina, famotidina), inhibidores de la bomba de protones (omeprazol) e hidróxido de aluminio/ hidróxido de magnesio. Estos fármacos pueden reducir la exposición a Dasatinib por lo que no se recomienda el uso simultáneo. Sin embargo pueden administrarse productos con hidróxido de aluminio/hidróxido de magnesio hasta 2 horas antes/2 horas después de la administración de Dasatinib.

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer) :



- Diarrea, náuseas
- Infecciones, fiebre, escalofríos
- Erupción cutánea (enrojecimiento de la piel), picor
- Dificultad para respirar, tos

- Dolor de cabeza, mareo
- Aumento o disminución del peso
- Fatiga, cansancio
- Dolor muscular, dolor abdominal.
- Puede aumentar el riesgo de hematomas y hemorragias (sangrado), tenga cuidado con utensilios que corten.

Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntaselo a tu médico o farmacéutico.

Avisa rápidamente a tu médico si tienes

- Una reacción alérgica grave (Dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel).
- Signos de infección (Tos, escalofríos, fiebre alta > 38 °C).
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.
- Signos cardiacos como palpitaciones, dolor de pecho, dificultad para respirar.