

CONSERVACIÓN

(¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva Sunitinib cápsulas, en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad (guárdalas en un lugar seco).



CADUCIDAD

(¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en el envase.

ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en el Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que te hará tu médico especialista.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



Sutent 50 mg (Sunitinib)

Cápsulas 50 mg

Caja con 30 cápsulas duras

Conservación: Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.



Sunitinib cápsulas se toma por vía oral (por la boca).

Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR?



- Sunitinib cápsulas puede tomarse con o sin comidas. Pueden tomarse con un vaso de agua o zumo de manzana.
- Evita el contacto de la medicación con la piel. Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.
- Debes tragar las cápsulas enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar las cápsulas. Si tienes dificultad para tragar las cápsulas enteras puedes abrirlas y volcar el contenido en un yogur o compota de manzana.
- Si necesitas abrir las cápsulas, debes leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.
- Toma la medicación siempre a la misma hora. Se recomienda administrar por la noche.

¿QUÉ hacer si.....?



Si has olvidado tomar una dosis, tómala lo antes posible. Si ya ha pasado más de 12 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.



Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado la cápsula, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.



Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico

Si eres alérgico a Sunitinib, así como a alguno de los componentes de la cápsula.

PRECAUCIONES



- Si eres diabético debes controlar tus niveles de glucosa durante el tratamiento con Sunitinib.
- Si tienes hipertensión, debes controlar de forma habitual tu presión arterial.
- Consulta a tu médico o farmacéutico antes de vacunarte.
- Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento.

INTERACCIONES

Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.



Sunitinib cápsula puede interactuar con algunos medicamentos (ritonavir, itraconazol, eritromicina, claritromicina, dexametasona, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, fenobarbital e Hipericum perforatum) por eso es importante que antes de empezar cualquier tratamiento nuevo lo consultes con tu médico.

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer) :

- Hipertensión arterial (aumento de la tensión)
- Insuficiencia cardíaca, arritmias.



- Dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos, llagas, sequedad de boca, alteración del gusto, pérdida de apetito.
- Caída del pelo.
- Cansancio, dolor de cabeza, mareos, dolores musculares y en las extremidades.
- Erupciones cutáneas, rash, sequedad de piel.
- Aumento del riesgo de hemorragias (Sangrado nasal).
- Cambios en el color de la orina.
- Aumento del lagrimeo.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones.

Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntaselo a tu médico o farmacéutico.

Avisa rápidamente a tu médico si tienes

- Una reacción alérgica grave (Dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel)
- Signos de infección (Tos, escalofríos, fiebre alta > 38 °C).
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.
- Dolor de abdomen agudo.
- Dolor de cabeza intenso, convulsiones.