

CONSERVACIÓN

(¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva Erlotinib comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad (guárdalas en un lugar seco)



CADUCIDAD

(¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en el envase.

ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en el Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que te hará tu médico especialista.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:



PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



TARCEVA 25 mg (Erlotinib)

Comprimidos recubiertos con película 25 mg

Caja con 30 comprimidos

Conservación: Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.



Erlotinib comprimidos se toma por vía oral (por la boca).

Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR?



- Debes tomar Erlotinib comprimidos sin alimentos, al menos una hora antes o dos horas después de las comidas.

- Evita el contacto de la medicación con la piel. Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.

- Debes tragar los comprimidos enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar el comprimido en la boca, ni disolverlo.

- Si necesitas partir el comprimido, debes leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.

- Toma la medicación siempre a la misma hora.

¿QUÉ hacer si.....?



Si has olvidado tomar una dosis, tómala lo antes posible. Si ya ha pasado más de 12 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.

Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado el comprimido, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.



Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico

Si eres alérgico a Erlotinib, así como a alguno de los componentes del comprimido.

Este medicamento contiene lactosa. Si tu médico te ha dicho que tienes intolerancia a ciertos azúcares, consúltale antes de tomar este medicamento.

PRECAUCIONES



- Si estas en tratamiento con protectores del estómago, que sean inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, pantoprazol). Toma los protectores 4 horas antes o 2 horas después de tomar Erlotinib.

- Utiliza geles de baño sin detergente, cremas hidratantes de avena o aloe vera y champú suave.

- Protégete del sol con ropa adecuada y crema con filtro solar de protección superior a 15.

- Consulta con tu médico o farmacéutico antes de vacunarte.

- Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento.

INTERACCIONES

Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.



Erlotinib comprimidos puede interactuar con algunos medicamentos (ketoconazol, itraconazol, voriconazol, eritromicina, claritromicina, rifampicina, atazanavir, indinavir, nefazodona, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, warfarina, acenoocumarol, Hierba de San Juan o hipérico, Zumo de Pomelo) por eso es importante que antes de empezar cualquier tratamiento nuevo lo consultes con tu médico.

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer) :



- Diarrea.
- Náuseas y vómitos.
- Enrojecimiento y sequedad de la piel, picor.
- Dificultad para respirar. Tos.

- Mayor susceptibilidad de padecer infecciones.
- Dolor, enrojecimiento o llagas en la boca.
- Fatiga, cansancio.
- Pérdida de peso.

Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntaselo a tu médico o farmacéutico.

Avisa rápidamente a tu médico si tienes

- Erupción cutánea grave con formación de ampollas, descamación de la piel, fiebre.
- Dificultad para respirar.
- Dolor e inflamación de piernas., especialmente en la parte inferior y pantorrilla.
- Fiebre alta > 38 °C, escalofríos (signos de infección).
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.