

## CONSERVACIÓN

### (¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva Talidomida cápsulas, en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad (guárdalas en un lugar seco).



## CADUCIDAD

### (¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en el envase.

## ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en el Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que te hará tu médico especialista.

## RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



## COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

## PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



### Talidomida 50mg cápsulas

Cápsulas de 50 mg

**Conservación:** Mantenga las cápsulas en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad.



Talidomida cápsulas se toma por vía oral (por la boca).

Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR?



• Talidomida cápsulas puede tomarse con o sin comidas.

• Evita el contacto de la medicación con la piel. Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.

• Debes tragar las cápsulas enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar las cápsulas. Si tienes problemas para tragar, existe la posibilidad de que tu farmacéutico elabore una Fórmula Magistral (Talidomida suspensión).

• Si necesitas manipular las cápsulas, debes leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.

• Toma la medicación siempre a la misma hora, preferiblemente por la noche, antes de irte a dormir. Esto hará que sientas menos somnolencia en otros momentos del día.

¿QUÉ hacer si.....?



Si has olvidado tomar una dosis, tómala lo antes posible. Si ya ha pasado más de 12 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.

Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado la cápsula, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.



Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico

Si eres alérgico a Talidomida, así como a alguno de los componentes de la cápsula.

Este medicamento contiene lactosa. Si tu médico te ha dicho que tienes intolerancia a ciertos azúcares, consúltale antes de tomar este medicamento

PRECAUCIONES



• Si tienes una enfermedad hepática (del hígado).

• Si tienes una enfermedad renal (del riñón).

• Si has tenido alguna enfermedad que afecte a la absorción intestinal.

• Consulta a tu médico o farmacéutico antes de vacunarte.

• Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento

INTERACCIONES

Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.



Talidomida cápsula puede interactuar con algunos medicamentos rifampicina, zalcitabina, estavudina, didanosina, fenitoína, carbamazepina, medicamentos que produzcan somnolencia como ansiolíticos, antidepresivos, antihistamínicos, medicamentos para tratar el dolor o el insomnio por eso es importante que

antes de empezar cualquier tratamiento nuevo lo consultes con tu medico.

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer) :



- Cansancio, somnolencia,
- Ritmo cardíaco lento, mareos.
- Entumecimiento, hormigueo, dolor o inflamación de las manos o pies.
- Enrojecimiento y picor de la piel.

- Náuseas, vómitos, estreñimiento.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debes tomar medidas higiénicas.

Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntaselo a tu médico o farmacéutico.

Avisa rápidamente a tu médico si tienes

- Erupción cutánea grave con formación de ampollas, descamación de la piel, fiebre.
- Dificultad para respirar.
- Dolor e inflamación de piernas., especialmente en la parte inferior y pantorrilla.
- Fiebre alta > 38 °C, escalofríos (signos de infección).
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.