

CONSERVACIÓN

(¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva Tioguanina comprimidos en su envase original, a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad (guárdalas en un lugar seco).



CADUCIDAD

(¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en el envase.

ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en el Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que te hará tu médico especialista o en las Oficinas de Farmacia.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



TIOGUANINA ASPEN 40 mg (Tioguanina)

Comprimidos 40 mg

Caja con 25 comprimidos

Conservación: Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.



Tioguanina comprimidos se toma por vía oral (por la boca).

Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR?



• Tioguanina comprimidos debe tomarse sin alimentos, es decir, una hora antes o dos horas después de comer. Toma el comprimido con abundante agua. No lo mezcles con productos lácteos (leche, yogures, helados) ni con bebidas calientes. Durante el tratamiento y salvo que tu médico indique lo contrario, debes beber abundante cantidad de agua y líquidos.

- Evita el contacto de la medicación con la piel. Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.
- Debes tragar los comprimidos enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar los comprimidos.
- Si necesitas partir el comprimido, debes leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.
- Toma la medicación siempre a la misma hora.

¿QUÉ hacer si.....?

Si has olvidado tomar una dosis, tómala lo antes posible. Si ya ha pasado más de 6 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.



Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado el comprimido, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.



Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico

Si eres alérgico a Mercaptopurina o Tioguanina, así como a alguno de los componentes del comprimido.

Este medicamento contiene **lactosa**. Si tu médico te ha dicho que tienes intolerancia a ciertos azúcares, consúltale antes de tomar este medicamento

PRECAUCIONES



- Si padeces una enfermedad hepática (del hígado).
- Si padeces una enfermedad renal (del riñón).
- Si has tenido cálculos renales.
- Consulta a tu médico o farmacéutico antes de vacunarte.
- Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento.

INTERACCIONES

Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.



Tioguanina comprimidos puede interactuar con algunos medicamentos (alopurinol, busulfano, carbamacepina, gentamicina, derivados de los aminosalicilatos) por eso es importante que antes de empezar cualquier tratamiento nuevo lo consultes con tu médico.

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer) :



- Náuseas y vómitos.
- Cansancio.
- Falta de apetito. Debilidad.
- Llagas en la boca.
- Erupción cutánea (puede empeorar con la exposición al sol).
- Alteraciones del hígado que pueden aparecer como coloración amarillenta en los ojos o la piel.
- Orina oscura.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debes tomar medidas higiénicas.
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias (sangrado). Debes tener cuidado con utensilios que corten.

Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntaselo a tu médico o farmacéutico.

Avisa rápidamente a tu médico si tienes

- Dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel (reacción alérgica grave).
- Fiebre alta > 38 °C, escalofríos (signos de infección).
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.