

CONSERVACIÓN

(¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva Topotecán solución oral a Temperatura ambiente, protegida de la luz y de la humedad.



CADUCIDAD

(¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en el frasco.

ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en el Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que te hará tu médico especialista (fórmula magistral).

RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



Topotecan 1 mg/mL SOLUCIÓN ORAL (Fórmula Magistral)

Solución Oral 1 mg/mL (excipientes: agua para inyectables) en frasco o jeringas monodosis.

Conservación: temperatura ambiente protegido de la luz.

Caducidad: 28 días.



Topotecán solución se toma por vía oral (por la boca).

Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR?



- Topotecán solución puede tomarse con o sin alimentos. Puedes mezclar la dosis con algo de zumo de naranja o manzana.
- Evita el contacto de la medicación con la piel. Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.

- Toma la medicación siempre a la misma hora.

¿QUÉ hacer si.....?

Si has olvidado tomar una dosis, tómala lo antes posible. Si ya ha pasado más de 12 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.



Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado la solución, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.



Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico

Si eres alérgico a Topotecán, así como a alguno de los componentes de la solución.

PRECAUCIONES



- Si padeces una enfermedad hepática (del hígado).
- Si padeces una enfermedad renal (del riñón).
- Si has sufrido alguna enfermedad que afecte a la absorción intestinal.
- Consulta a tu médico o farmacéutico antes de vacunarte.
- Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento.

INTERACCIONES

Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.



Topotecán solución puede interactuar con algunos medicamentos (con ciclosporina, ketonakol, ritonavir, saquinavir) por eso es importante que antes de empezar cualquier tratamiento nuevo lo consultes con tu medico.

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer) :

- Sensación de debilidad y cansancio.
- Moratones o sangrado. Ten especial cuidado al utilizar utensilios cortantes.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debes tomar medidas higiénicas.
- Náuseas y vómitos.
- Diarrea, estreñimiento y dolor de estómago.
- Ulceras (heridas) en la boca, lengua y encías.
- Pérdida de pelo.



Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntaselo a tu médico o farmacéutico.

Avisa rápidamente a tu médico si tienes

- Más de 3 episodios de diarrea en un día.
- Una reacción alérgica grave (Dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel).
- Signos de infección (Tos, escalofríos, fiebre alta > 38 °C).
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.