

## CONSERVACIÓN

### (¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva Etoposido cápsulas en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad (guárdalas en un lugar seco).



## CADUCIDAD

### (¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en el envase.

## ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en el Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que te hará tu médico especialista o en la Oficina de Farmacia.

## RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



## COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

## PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



### Vepesid (Etoposido)

Cápsulas de 50 mg y de 100 mg

Caja con 20 cápsulas en la dosis de 50mg, y cajas con 10 cápsulas en la dosis de 100 mg.

**Conservación:** Conservar las cápsulas en los blisteres y éstos, a su vez, en las cajas de cartón para protegerlos de la luz y de la humedad.



Etopósido cápsulas se toma por vía oral (por la boca).

Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

**¿CÓMO SE DEBE TOMAR?**



• Etoposido cápsulas debe tomarse con el estómago vacío. Se recomienda no ingerir alimentos ni beber líquidos desde una hora antes hasta dos horas después.

• Evita el contacto de la medicación con la piel. Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.

- Debes tragar las cápsulas enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar la cápsula en la boca. Si no puedes tragar la cápsula con facilidad, existe la opción de que tu farmacéutico te prepare una solución oral (Fórmula Magistral).
- Si necesitas manipular las cápsulas, debes leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.
- Toma la medicación siempre a la misma hora.

**¿QUÉ hacer si.....?**



Si has olvidado tomar una dosis, tómala lo antes posible. Si ya ha pasado más de 12 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.

Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado la cápsula, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.



Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico

Si eres alérgico a Etoposido, así como a alguno de los componentes de la cápsula.

**PRECAUCIONES**



• Si tienes alguna enfermedad relacionada con el hígado.

• Si tienes alguna enfermedad que afecte a la absorción intestinal.

- Consulta con tu médico o farmacéutico antes de vacunarte.
- Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento.


**INTERACCIONES**

Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.



Etoposido cápsulas puede interactuar con algunos medicamentos (fosaprepitant, aprepitant, ciclosporina, ciclofosfamida, vinblastina, adriamicina, cisplatino, warfarina, fenitoina, fenobarbital, atovacuona, fenilbutazona y vacunas vivas) por eso es importante que antes de empezar cualquier tratamiento nuevo lo consultes con tu medico.

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer):



- Anemia y trombocitopenia.
- Náuseas y vómitos.
- Cansancio.
- Diarrea.

- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Tomar medidas higiénicas que puedan evitarlas.
- Pérdida de cabello.
- Reacciones alérgicas.

Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntaselo a tu médico o farmacéutico.

**Avisa rápidamente a tu médico si tienes**

- Dificultad para respirar.
- Fiebre alta > 38 °C.
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.