

CONSERVACIÓN

(¿Cómo guardar la medicación?)

Conserva Tretinoína cápsulas en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad (guárdalas en un lugar seco).



CADUCIDAD

(¿Cuándo caduca la medicación?)



No utilices esta medicación después de la fecha de caducidad que viene indicada en el envase.

ADVERTENCIAS



Esta medicación la podrás adquirir en el Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que te hará tu médico especialista.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.



COMO CONTACTAR

TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



Vesanoïd 10 mg (tretinoïna) (*)

Cápsulas blandas de 10 mg

Caja con 100 cápsulas

Conservación: mantenga las cápsulas en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad.

(*) Otros nombres: ATRA, ácido holo trans retinoico.



Tretinoína cápsulas se toma por vía oral (por la boca).

Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar y cuántas veces al día.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR?



• Tretinoína cápsulas debe tomarse con alimentos (preferiblemente con comidas que tengan alto contenido en grasa). La cápsula puede tomarse con agua o leche.

• Evita el contacto de la medicación con la piel. Lávate las manos antes y después de tomar la medicación.

• Debes tragar las cápsulas enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar las cápsulas. Si tienes dificultad para tragar las cápsulas, se puede preparar una emulsión en leche. Calienta unos 50 ml de leche aproximadamente. Echa la cápsula en la leche caliente, agita para que se disuelva la cápsula y tómalala inmediatamente, También existe la posibilidad de que tu farmacéutico te elabore una fórmula magistral (suspensión oral).

• Si necesitas manipular la cápsula, debes leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.

• Toma la medicación siempre a la misma hora.

¿QUÉ hacer si.....?

Si has olvidado tomar una dosis, tómalala lo antes posible. Si ya ha pasado más de 6 horas, espera a la siguiente toma. Nunca tomes una dosis doble.



Si vomitas en los 30 minutos después de haber tomado la cápsula, vuelve a tomar la dosis que te ha prescrito el médico. Si ha pasado más de 30 minutos no repitas la dosis.



Si tomas más dosis de la que te ha prescrito tu médico, avísale. En caso de sobredosis o ingestión accidental, ve al médico o consulta al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

En caso de duda consulta a tu médico o farmacéutico

Si eres alérgico a tretinoína o derivados de la vitamina A, así como a alguno de los componentes de la suspensión.

Este medicamento contiene aceite de soja, por lo que está contraindicado si tienes alergia a la soja o a los cacahuetes.

Este medicamento contiene **sorbitol**. Si tu médico te ha dicho que tienes intolerancia a ciertos azúcares, consúltale antes de tomar este medicamento.

PRECAUCIONES



• Si padeces una enfermedad hepática grave (del hígado).

• Si has sufrido alguna enfermedad que afecte a la absorción intestinal.

• Consulta a tu médico o farmacéutico antes de vacunarte.

• Toma 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento.

INTERACCIONES

Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.



Tretinoína cápsula puede interactuar con algunos medicamentos (glucocorticoides, rifampicina, eritromicina, fenobarbital, cimetidina, verapamilo, diltiazem, ciclosporina, ciertos anticonceptivos orales, tetraciclina, vitamina A) por eso es importante que antes

de empezar cualquier tratamiento nuevo lo consultes con tu médico.

Los efectos adversos que aparecen de forma más frecuente con la toma de esta medicación son (esto no significa que vayas a padecerlos, pero pueden aparecer) :



• Dolor de cabeza.

• Cansancio.

• Sequedad de piel y mucosas, incluida la sequedad ocular.

• Náuseas y vómitos..

• Erupción, picor, enrojecimiento, descamación e inflamación de la piel, que pueden empeorar con la exposición solar.

• Dolor de huesos o articulaciones, fiebre.

• Diarrea, estreñimiento y malestar de estómago.

• Alteración de las pruebas de función hepática.

• Aumento del colesterol y triglicéridos en sangre.

• Cambios en la visión o la audición.

Si tuvieras alguno de estos síntomas o cualquier otro que creas pueda estar relacionado con la medicación, coméntase-

Avisa rápidamente a tu médico si tienes

• Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar).

• Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre >38°C, dificultad al orinar.

• Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.

• Dificultad para respirar, hipotensión, aumento de peso, hinchazón de las manos y pies, dolor en el pecho.

• Dolor de cabeza que no cede.