

RECOMENDACIONES AL PACIENTE:



COMO CONTACTAR


TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de los profesionales sanitarios.

Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; con esta finalidad le proporcionamos información y educación.

Consulte a su médico o farmacéutico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.



PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



ADMINISTRACIÓN DE CÁPSULAS BLANDAS



Antes de iniciar el tratamiento, lee con atención las **instrucciones básicas de manejo de quimioterapia oral en casa.**

Las cápsulas blandas contienen en su interior la medicación y al estar compuestas de una sola pieza son más complicadas de manipular, que las cápsulas duras.



Trata de tragar las cápsulas blandas enteras. Dependiendo de qué medicación te haya prescrito el médico podrás tomarlas con o sin comidas (lee atentamente el apartado **-¿CÓMO se debe TOMAR?-** del tríptico correspondiente al medicamento que debes de tomar donde se especificará si la medicación debe tomarse con comidas o con el estómago vacío). No mastiques ni chupes la cápsula en la boca.

¿Qué debo hacer si no puedo tragar la cápsula?

Si en la información del fármaco que estas tomando, se indica que la cápsula blanda se puede abrir, sigue las siguientes instrucciones para su manipulación:

<p>Ponte guantes y mascarilla para manipular la cápsula</p>	
<p>Con unas tijeras haz un corte en la parte superior de la cápsula (aproximadamente al nivel de la línea señalada).</p> <p>Lava bien con agua y con jabón las tijeras una vez hayas terminado</p>	

<p>Vierte el contenido del interior de la cápsula en una cuchara y adminístralo inmediatamente. Asegúrate de sacar todo el contenido.</p> <p>Con determinados fármacos podrás mezclar el contenido de la cápsula con alimentos como leche, yogur, helado.</p>	
---	--

Si en la información del fármaco que estas tomando, se indica que puedes prepara una emulsión en leche (Ej. tretinoína-Vesanoid®-), sigue las siguientes instrucciones:

<p>Llena un vaso con un poco de leche (aproximadamente 50 ml)</p>	
<p>Calienta la leche</p>	
<p>En la leche caliente, introduce la cápsula blanda y remueve con una cucharilla hasta que la cápsula se haya disuelto.</p> <p>Tómala inmediatamente.</p> <p>Lava bien el vaso con agua y con jabón.</p>	