

RECOMENDACIONES AL PACIENTE:



COMO CONTACTAR


TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de los profesionales sanitarios.

Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; con esta finalidad le proporcionamos información y educación.

Consulte a su médico o farmacéutico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.



PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



ADMINISTRACIÓN DE COMPRIMIDOS



Antes de iniciar el tratamiento, lee con atención **las instrucciones básicas de manejo de quimioterapia oral en casa.**



Trata de tragar los comprados enteros. Dependiendo de qué medicación te haya prescrito el médico podrás tomarlos con o sin comidas (lee atentamente el apartado **-¿CÓMO se debe TOMAR?**- del tríptico correspondiente al medicamento que debes de tomar donde se especificará si la medicación debe tomarse con comidas o con el estómago vacío). No

¿Qué debo hacer si no puedo tragar el comprimido?

Si en la información del fármaco que estas tomando, se indica que el comprimido se puede fraccionar o triturar para facilitar su administración, sigue las siguientes instrucciones para su manipulación:

Ponte guantes y mascarilla para manipular el comprimido



FRACCIONAR COMPRIMIDOS

Si necesitas fraccionar el comprimido puedes ayudarte de los pastilleros que tienen una cuchilla incorporada o hacerlo con la ayuda de un cuchillo si el comprimido está ranurado.



TRITURAR COMPRIMIDOS

Algunos comprimidos se pueden triturar y mezclar con una pequeña cantidad de comida.

Si no estas seguro de que el comprimido pueda ser triturado o machacado, habla con tu médico o farmacéutico.

Coloca el comprimido en el interior de una bolsita de plástico y ejerce presión con la ayuda de una cuchara o espátula, con precaución para que no se rompa la bolsa.

Mézclalo con una pequeña cantidad de alimento blando como yogur, helado, mermelada.

Tómalo inmediatamente.

DISOLVER Y DISPENSAR COMPRIMIDOS

Disuelve el comprimido en un vaso pequeño de agua. Puedes añadirle un poco de zumo para mejorar el sabor de la mezcla.



Tómalo inmediatamente.

Algunos comprimidos se pueden disolver y dispensar en un vaso de agua.

Si no estas seguro de que el comprimido pueda disolverse, habla con tu médico o farmacéutico.

Añade en el vaso vacío un poco más de agua o zumo, y bébela para asegurarte de que no quedan restos de comprimido en el vaso.

También puedes usar una jeringa para disolver el comprimido. Saca el embolo de la jeringa e introduce el comprimido por la parte superior. Vuelve a colocar el embolo y llena la jeringa con 5-10 ml de agua. Agítala hacia arriba (para evitar que se salga el agua) hasta que se disuelva el comprimido.



COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO



No aplastes, ni tritures los comprimidos que tienen cubierta entérica. Estos comprimidos tienen un recubrimiento entérico para proteger el estómago.

Esta información se indica en la etiqueta del medicamento (*comprimidos con cubierta*).

Fecha elaboración/fecha de revisión

Febrero 2014/Marzo 2014