

RECOMENDACIONES AL PACIENTE:



COMO CONTACTAR


TELEFONO FARMACIA:

HORARIO:

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de los profesionales sanitarios.

Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; con esta finalidad le proporcionamos información y educación.

Consulte a su médico o farmacéutico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.



PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



ADMINISTRACIÓN DE JARABES Y LIQUIDOS ORALES




Antes de iniciar el tratamiento, lee con atención las **instrucciones básicas de manejo de quimioterapia oral en casa.**




Dependiendo de qué medicación te haya prescrito el médico podrás tomarlos con o sin comidas (lee atentamente el apartado **-¿CÓMO se debe TOMAR?-** del tríptico correspondiente al medicamento que debes de tomar donde se especificará si la medicación debe tomarse con comidas o con el estómago vacío).

<p>Agita bien el frasco de medicación antes de coger la cantidad de fármaco que tienes que tomar.</p>	
<p>Mide la dosis prescrita usando una jeringa oral. No uses una cuchara de cocina para medir la dosis porque lo más seguro es que así no tomes la cantidad correcta.</p>	
<p>Toma la dosis inmediatamente. Después de tomar la dosis, puedes beber un vaso de leche o zumo para enmascarar el sabor del medicamento.</p>	



MEZCLAR EL MEDICAMENTO CON LECHE O ZUMO

<p>Algunos medicamentos pueden mezclarse con agua o zumo. Si no estas seguro de que el medicamento pueda mezclarse, habla con tu médico o farmacéutico.</p>	<p>Con una jeringa oral coge la cantidad de fármaco prescrita. Añade la dosis a un vaso de leche o de zumo, mézclalo bien.  Tómalo inmediatamente. Añade un poco más de leche o zumo al vaso, y tómala para asegurarte de que no quedan restos de medicamento en el vaso.</p>
--	--

USO DE LA JERINGA ORAL. FRASCO SIN TAPÓN OBTURADOR

	<p>Agita bien el frasco. Retira la tapa. Introduce la jeringa en el frasco de medicación. Tira del émbolo lentamente hasta el volumen de fármaco que debes tomar.</p>
	

USO DE LA JERINGA ORAL. FRASCO CON TAPÓN OBTURADOR

	<p>Agita bien el frasco. Retira la tapa. Si el frasco presenta un tapón obturador, introduce la jeringa en este obturador.  Gira el frasco entero con la jeringa y tira del émbolo lentamente hasta el volumen de fármaco que debes tomar.  Desconecta la jeringa del frasco y toma la medicación.</p>
---	--

ADMINISTRACIÓN DEL FÁRMACO

	<p>Debes estar de pie o bien sentado. Coloca la jeringa dentro de la boca, con la punta cerca de la cara interior de la mejilla. Empuja el émbolo despacio, para que puedas tragar a medida que la medicina sale. No lo hagas demasiado deprisa ya que te puedes atragantar.</p>
--	--

ALGUNOS JARABES, SUSPENSIONES O SOLUCIONES DEBEN GUARDARSE EN LA NEVERA. LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN DE CADA MEDICAMENTO.

Fecha elaboración/fecha de revisión

Febrero 2014/Marzo 2014