


Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)



BUSULFANO 2 mg COMPRIMIDOS

Comprimidos recubiertos de 2 mg

Caja con 100 comprimidos

Conservación: Mantenga las cápsulas en su envase original a temperatura ambiente, protegido de la luz y de la humedad.



POSOLOGIA

- Busulfano comprimidos se administrará por vía oral.
- Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la frecuencia.

¿CÓMO se debe TOMAR BUSULFÁN comprimidos recubiertos?

- Busulfano cápsulas puede tomarse con o sin alimentos.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolverlos.
- Para facilitar la ingestión de dosis altas, se pueden introducir varios comprimidos en cápsulas de gelatina.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Mantenga siempre el mismo horario.
- Si se requiere partir el comprimido, debe leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.

¿QUÉ hacer si.....?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis tómela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita en los 30 minutos después de haber tomado el comprimido, repita la dosis. Si han pasado más de 30 minutos no repita la dosis.
- Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Instituto Nacional de Toxicología (Teléfono: 91 562 04 20).
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar BUSULFANO comprimidos?

- Si es alérgico a Busulfano así como a alguno de los componentes del comprimido.
- Busulfano comprimidos contienen lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

PRECAUCIONES

- Si padece alguna enfermedad respiratoria (displasia broncopulmonar, fibrosis pulmonar), cardíaca o hepática.
- Usar con precaución en pacientes con antecedentes de convulsiones o traumatismo craneoencefálicos (principalmente aquellos pacientes que van a recibir altas dosis de Busulfano. En estos casos, valorar la profilaxis antimicrobiana)
- En niñas adolescentes, evitar quedarse embarazadas durante el tratamiento y el mes posterior a la finalización.

INTERACCIONES

- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma: fenitoína, itraconazol, metronidazol, natalizumab, paracetamol, pimecrolimus, roflumilast, tacrólimus tópico, tioguanina o vacunas vivas.

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante la toma de Busulfan (que no significa que aparezcan en todos los pacientes) son:

- Edema, hipertensión, taquicardia
- Rash cutáneo (que normalmente empieza en palmas de las manos o plantas de los pies)
- Hiperglucemia o alteraciones electrolíticas
- Estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, estomatitis, anorexia, náuseas o vómitos
- Mareo, dolor de cabeza, insomnio, ansiedad.
- Tos, rinitis, fiebre, dolor, temblores, escalofríos

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Dificultad respiratoria, tos, fiebre, dolor de garganta.
- Sangrado o moratones.
- Debilidad, fatiga, anorexia, pérdida de peso, náuseas o vómitos.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

CONSERVACIÓN

- Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad

CADUCIDAD

- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase

ADVERTENCIAS

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños
- Este medicamento se puede conseguir a través del Servicio de Farmacia del Hospital o en su Farmacia habitual, con la receta que le hará su médico de este Centro.

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

REFERENCIAS

- **Micromedex Healthcare® Series** [base de datos en Internet]. Greenwood Village, Colorado: Thomson MICROMEDEX DRUGDEX® System. 1974-2012. Disponible en: <http://www.thomsonhc.com/home/dispatch> Drugdex ® de Thomson Micromedex ® Healthcare Series.
- Taketomo CK, Hodding JH, Kraus DM. **Pediatric and Neonatal Dosage Handbook**. 18 th ed. American Pharmacists Association. Lexicomp.
- Diedra L. Bragalone. **Drug information Handbook for Oncology**, 9th ed. American Pharmacists Association. Lexicomp
- **BNF for Children**, 2012-2013
- **Ficha técnica del Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS-CIMA** [base de datos en Internet]. Madrid, España: Agencia española de medicamentos y productos sanitarios(AEMPS). Disponible en: <https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm>

FECHA DE ELABORACIÓN/ FECHA DE REVISION

Septiembre 2013/Enero 2014