

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)



BUSULFANO suspensión oral (fórmula magistral)

Suspensión oral 2 mg/mL (Contiene jarabe simple)

Conservación: nevera (2-8°C) en su envase original y protegido de la luz.

Caducidad: 30 días



POSOLOGIA

- Busulfano suspensión oral se administrará por vía oral
- Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la frecuencia.

¿CÓMO se debe TOMAR BUSULFÁN suspensión oral?

- Busulfano suspensión oral puede tomarse con o sin alimentos.
- Agitar la suspensión antes de coger la dosis prescrita.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Mantenga siempre el mismo horario

¿QUÉ hacer si.....?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis tómela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita en los 30 minutos después de haber tomado la suspensión, repita la dosis. Si han pasado más de 30 minutos no repita la dosis.
- Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Instituto Nacional de Toxicología (Teléfono: 91 562 04 20).
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar BUSULFANO suspensión oral?

- Si es alérgico a Busulfano
- Busulfano comprimidos (a partir de los cuales se elabora la suspensión oral) contienen sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

PRECAUCIONES

- Si padece alguna enfermedad respiratoria (displasia broncopulmonar, fibrosis pulmonar), cardíaca o hepática.
- Usar con precaución en pacientes con antecedentes de convulsiones o traumatismo craneoencefálicos (principalmente aquellos pacientes que van a recibir altas dosis de Busulfano. En estos casos, valorar la profilaxis anticomicial)
- En niñas adolescentes, evitar quedarse embarazadas durante el tratamiento y el mes posterior a la finalización.

INTERACCIONES

- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma: fenitoína, itraconazol, metronidazol, natalizumab, paracetamol, pimecrolimus, roflumilast, tacrólimus tópico, tioguanina o vacunas vivas.

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante la toma de Busulfán (que no significa que aparezcan en todos los pacientes) son:

- Edema, hipertensión, taquicardia
- Rash cutáneo (que normalmente empieza en palmas de las manos o plantas de los pies)
- Hiperglucemia o alteraciones electrolíticas
- Estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, estomatitis, anorexia, náuseas o vómitos
- Mareo, dolor de cabeza, insomnio, ansiedad.
- Tos, rinitis, fiebre, dolor, temblores, escalofríos

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Dificultad respiratoria, tos, fiebre, dolor de garganta.
- Sangrado o moratones.
- Debilidad, fatiga, anorexia, pérdida de peso, náuseas o vómitos.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

CONSERVACIÓN

- Conserve busulfano suspensión oral en la nevera.

CADUCIDAD

- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase

ADVERTENCIAS

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños
- Este medicamento se puede conseguir a través del Servicio de Farmacia del Hospital o en su Farmacia habitual, con la receta que le hará su médico de este Centro.

REFERENCIAS

- **Micromedex Healthcare® Series** [base de datos en Internet]. Greenwood Village, Colorado: Thomson MICROMEDEX DRUGDEX® System. 1974-2012.

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

Disponible en: <http://www.thomsonhc.com/home/dispatch> Drugdex ® de Thomson
Micromedex ® Healthcare Series.

- Taketomo CK, Hodding JH, Kraus DM. **Pediatric and Neonatal Dosage Handbook**. 18 th ed. American Pharmacists Association. Lexicomp.
- Diedra L. Bragalone. **Drug information Handbook for Oncology**, 9th ed. American Pharmacists Association. Lexicomp
- **BNF for Children**, 2012-2013
- **Ficha técnica del Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS-CIMA [base de datos en Internet]**. Madrid, España: Agencia española de medicamentos y productos sanitarios(AEMPS). Disponible en: <https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm>

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Busulfán suspensión 2 mg/ml (50 ml):

- Busulfán comprimidos 2 mg50 comprimidos (100 mg Busulfán)
- Jarabe simple c.s.p.....50 ml

FECHA DE ELABORACIÓN/ FECHA DE REVISION

Septiembre 2013/Enero 2014