

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)



Genoxal® 50 mg Grageas (Ciclofosfamida)

Presentación / dosis: Grageas 50 mg

Caja con 20 grageas.

Conservación: Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.



POSOLOGIA

- Ciclofosfamida grageas se administrará por vía oral.
- Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la frecuencia.

¿CÓMO se debe TOMAR CICLOFOSFAMIDA GRAGEAS?

- Ciclofosfamida grageas puede tomarse con o sin alimentos.
- Las grageas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolverlas. Si tiene problemas para tragar existe la alternativa de una fórmula magistral de ciclofosfamida solución oral. Durante el tratamiento y salvo que su médico indique lo contrario, debe beber abundante cantidad de agua y líquidos.
- Mantenga siempre el mismo horario.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.

¿QUÉ hacer si.....?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis tómela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita no repita la dosis.
- Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Instituto Nacional de Toxicología (Teléfono: 91 562 04 20).
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar CICLOFOSFAMIDA GRAGEAS?

- Si es alérgico a Ciclofosfamida o a alguno de los componentes de las grageas.
- Las grageas contienen lactosa y sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con el antes de tomar este medicamento.

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

PRECAUCIONES

- Si tiene enfermedad hematológica.
- Si tiene enfermedad hepática.
- Si tiene enfermedad renal.
- Si ha sufrido alguna enfermedad que afecte de manera importante a la absorción intestinal.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

INTERACCIONES

- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.
- Ciclofosfamida grageas puede interactuar con alopurinol, ciclosporina, etanercept, tiazidas, warfarina, ciprofloxacino, fenitoína, fenobarbital y vacunas.

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante la toma de Ciclofosfamida (que no significa que aparezcan en todos los pacientes) son:

- Náuseas y vómitos
- Caída de cabello
- Erupción cutánea
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias (sangrado), tenga cuidado con utensilios que corten
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Micción dolorosa
- Hinchazón de manos y pies.
- Orina de color más oscuro.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave (Dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel)
- Signos de infección (Tos, escalofríos, fiebre alta > 38 °C)
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

CONSERVACIÓN

- Conservar en el envase original a temperatura ambiente.
- Proteger de la luz y la humedad (guardar en un lugar seco).

CADUCIDAD

- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Esta medicación deberá ser dispensada por los Servicios de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico especialista o en las Oficinas de Farmacia.

REFERENCIAS

- Micromedex 2.0 [base de datos en Internet]. MICROMEDEX DRUGDEX® System. 2012-2013 Truven Health Analytics Inc. Disponible en: <http://www.micromedexsolutions.com/home/dispatch>. Consultado el 13 de noviembre

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

- de 2013.
- UptoDate®. (Base de datos en internet). Pediatric Drug Information Lexicomp ®. Wolters Kluwer Health Clinical Solutions 2013. Disponible en: <http://www.uptodate.com>. Consultado el 13 de noviembre de 2013.
 - Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Catálogo de Medicamentos 2012. Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
 - Drug Formulary for patients. Cancer Care Ontario. Disponible en: <https://www.cancercare.on.ca/toolbox/drugs/patientdruginfo/>. Último acceso 13/11/13
 - Kennedy R, Groepper D, Tagen M, Christensen R, Navid F, Gajjar A, Stewart CF. Stability of cyclophosphamide in extemporaneous oral suspensions. Ann Pharmacother. 2010;44:295-301

FECHA DE ELABORACIÓN/ FECHA DE REVISION

Noviembre 2013/Febrero 2014