

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)



MELFALAN Aspen® 2 mg (Melfalan)

Comprimidos 2 mg

Caja con 50 comprimidos

Conservación: Mantenga los comprimidos en su envase original, en nevera (2-8°C), protegidos de la luz y de la humedad.



POSOLOGIA

- Melfalan comprimidos se administrará por vía oral.
- Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la frecuencia.

¿CÓMO se debe TOMAR MELFALAN comprimidos?

- Melfalan comprimidos debe tomarse con el estómago vacío, 1 hora antes, o 2 horas después de una comida, con un vaso de agua.
- Mantenga siempre el mismo horario.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Si se requiere partir el comprimido, debe leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.

¿QUÉ hacer si.....?

- Si ha olvidado una dosis, adminístrela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no tome la dosis olvidada (nunca doble la dosis).
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de media hora desde la toma
- Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Instituto Nacional de Toxicológica (Tfno: 91 562 04 20).
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar MELFALAN?

- Si es alérgico a melfalan, así como a alguno de los componentes del comprimido.
- Pacientes con supresión grave de la médula ósea
- Embarazo

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

PRECAUCIONES

- Melfalan provoca una supresión de la médula ósea (trombocitopenia, neutropenia, anemia). deben realizarse recuentos sanguíneos frecuentes y retrasar o ajustar la dosis conforme a los resultados. Los recuentos pueden seguir disminuyendo una vez suprimido el tratamiento. Se debe interrumpir el tratamiento si se alcanzan cifras de leucocitos $<3.000/\text{mm}^3$ o de plaquetas $<100.000/\text{mm}^3$.
- Usar con precaución en pacientes con enfermedad renal. Puede ser necesario disminuir la dosis.
- Usar con precaución en pacientes que han sufrido alguna enfermedad que afecte a la absorción intestinal.
- **Embarazo:** categoría D de la FDA Uso contraindicado.
- **Lactancia:** aunque se desconoce si se excreta en la leche materna, debido a su efecto mielosupresore, se recomienda suspender la lactancia o evitar el medicamento..

INTERACCIONES

- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.
- Melfalan comprimidos puede interactuar con ciclosporina, cisplatino, antiácidos (antihistamínicos H2, inhibidores de la bomba de protones): reducen la absorción de melfalan por reducir la acidez gástrica; carmustina; digoxina: el melfalan reduce los niveles plasmáticos de digoxina; vacunas con virus vivos (rubeola, paperas, varicela, sarampión): puede causar infección en pacientes inmunodeprimidos.

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante la toma de Melfalan (que no significa que aparezcan en todos los pacientes) son:

- Mucositis, estomatitis, diarrea, náuseas y vómitos
- A nivel hematológico, frecuente mielosupresión, especialmente leucopenia y trombocitopenia, anemia hemolítica. Se inicia a los 7 días, alcanza el máximo a los 14-35 días y suele recuperarse a los 28-56 días.
- Enfermedad hepática, hepatitis
- Alopecia, erupción cutánea, vasculitis, extravasaciones vesicantes, ulceraciones y/o necrosis epidérmica.
- Dolores musculares y de articulaciones. Dolor torácico.
- Erupciones en la piel, picor.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Fiebre, escalofríos
- Puede aumentar el riesgo de hematomas y hemorragias (sangrado), tenga cuidado con utensilios que corten.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Dificultad para respirar, tos, escalofríos.
- Fiebre alta $> 38\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.
- Convulsiones.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

CONSERVACIÓN

- Conservar en el envase original, en nevera (entre 2 y 8°C).
- Proteger de la luz y la humedad.

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

CADUCIDAD

- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Esta medicación sólo puede conseguirse a través de receta médica, en una oficina de farmacia..

REFERENCIAS

- Fistera [base de datos en Internet]. Disponible en : <http://www.fistera.com/herramientas/medicamentos/melfalan/>. Consultado el 3 de diciembre de 2013
- Micromedex 2.0 [base de datos en Internet]. MICROMEDEX DRUGDEX® System. 2012-2013 Truven Health Analytics Inc. Disponible en: <http://www.micromedexsolutions.com/home/dispatch>. Consultado el 3 de diciembre de 2013.
- UptoDate®. (Base de datos en internet).Drug Information Lexicomp®. Wolters Kluwer Health Clinical Solutions 2013. Disponible en: <http://www.uptodate.com>. Consultado el 3 de diciembre de 2013
- Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. Pediamécum. Edición 2012. Melfalan. Disponible en: <http://www.pediamecum.es>. Consultado el 3 de diciembre de 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN/ FECHA DE REVISION

Diciembre de 2013/Febrero 2014

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)