

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)



Mercaptopurina Aspen® 50 mg (Mercaptopurine)

Comprimidos 50 mg

Caja con 25 comprimidos

Conservación: Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.



POSOLOGIA

- Mercaptopurina comprimidos se administrará por vía oral.
- Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la frecuencia.

¿CÓMO se debe TOMAR MERCAPTOPURINA comprimidos?

- Se recomienda tomar Mercaptopurina comprimidos con el estómago vacío, al menos una hora antes o dos horas después de las comidas. Se recomienda administrarlo por la tarde o antes de acostarse.
- Evite tomar Mercaptopurina juntamente con leche u otros productos lácteos. Debe espaciar la toma del medicamento al menos 1 hora antes o 2 horas después.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolverlos.
- Mantenga siempre el mismo horario.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Si se requiere partir el comprimido, debe leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales (*).

¿QUÉ hacer si.....?

- Si ha olvidado una dosis, adminístrela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no tome la dosis olvidada (nunca doble la dosis).
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de media hora desde la toma.
- Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Instituto Nacional de Toxicológica (Tfno: 91 562 04 20).
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar Mercaptopurina?

- Si es alérgico a Mercaptopurina o Tioguanina así como a alguno de los componentes del comprimido.

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

- Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con el antes de tomar este medicamento.

PRECAUCIONES

- Si tiene enfermedad hepática grave.
- Si tiene enfermedad renal.
- Si ha sufrido alguna enfermedad que afecte de manera importante a la absorción intestinal.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

INTERACCIONES

- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.
- Mercaptopurina comprimidos puede interactuar con alopurinol, anticoagulantes orales y vacunas.

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante la toma de Mercaptopurina (que no significa que aparezcan en todos los pacientes) son:

- Cansancio
- Náuseas y vómitos
- Dolores musculares y de articulaciones
- Erupción cutánea (puede empeorar con la exposición al sol)
- Micción dolorosa
- Llagas en la boca
- Pérdida de cabello
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias (sangrado), tenga cuidado con utensilios que corten

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

CONSERVACIÓN

- Conservar en el envase original a temperatura ambiente.
- Proteger de la luz y la humedad (guardar en un lugar seco).

CADUCIDAD

- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Esta medicación puede adquirirse en las Oficinas de Farmacia, con la receta que le hará su médico especialista.

REFERENCIAS

- Ficha técnica del Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS-CIMA [base de datos en Internet]. Madrid, España: Agencia española de medicamentos y productos sanitarios(AEMPS). Disponible en:
<https://sinaem4.agedmed.es/consaem/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm>.

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

Consultado el 9 de septiembre de 2013.

- Micromedex 2.0 [base de datos en Internet]. MICROMEDEX DRUGDEX® System. 2012-2013 Truven Health Analytics Inc. Disponible en: <http://www.micromedexsolutions.com/home/dispatch>. Consultado el 9 de septiembre de 2013.
- UptoDate®. (Base de datos en internet). Pediatric Drug Information Lexicomp®. Wolters Kluwer Health Clinical Solutions 2013. Disponible en: <http://www.uptodate.com>. Consultado el 9 de septiembre de 2013.
- Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. Pediamécum. Edición 2012. Mercaptopurina. Disponible en: <http://www.pediamecum.es>. Consultado el 9 de septiembre de 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN/ FECHA DE REVISION

Octubre 2013/Febrero 2014