

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)



Nexavar® 200 mg (Sorafenib)

Comprimidos 200 mg.

Caja con 112 comprimidos recubiertos.

Conservación: Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.



POSOLOGIA

- Sorafenib comprimidos recubiertos se administrará por vía oral.
- Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la frecuencia.

¿CÓMO se debe TOMAR SORAFENIB comprimidos?

- Sorafenib comprimidos debe tomarse con el estómago vacío, es decir, una hora antes o dos horas después de comer.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolverlos.
- Mantenga siempre el mismo horario. Se recomienda administrar por la noche.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Si se requiere fraccionar el comprimido, debe leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.

¿QUÉ hacer si.....?

- Si ha olvidado una dosis, adminístrela lo antes posible. Si han transcurrido más de 6 horas espere a la siguiente toma y no tome la dosis olvidada (nunca doble la dosis).
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de media hora desde la toma.
- Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Instituto Nacional de Toxicología (Teléfono: 91 562 04 20).
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar Sorafenib?

- Si es alérgico a Sorafenib, así como a alguno de los componentes del comprimido.

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

PRECAUCIONES

- Si tiene una enfermedad hepática grave.
- Si padece hipertensión.
- Si toma anticoagulantes orales.
- Consulta con su médico o farmacéutico si tomas otros medicamentos.

INTERACCIONES

- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.
- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de iniciar el tratamiento con Sorafenib, si está tomando antiasmáticos (teofilina), antiepilépticos (fenobarbital) y otros fármacos como cimetidina o aspirina

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante la toma de Sorafenib (que no significa que aparezcan en todos los pacientes) son:

- Anemia.
- Hemorragia. Mayor riesgo de sangrado.
- Náuseas, vómitos, diarrea.
- Hipertensión (aumento de la tensión).
- Exantema, alopecia, síndrome plantar-palmar, eritema, prurito (alteraciones de la piel, pérdida de pelo)
- Piel seca, acné, dermatitis, descamación cutánea.
- Fatiga, cansancio.
- Dolor (boca, abdominal, de huesos, de cabeza)

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel (reacción alérgica grave)
- Fiebre alta > 38 °C, escalofríos (signos de infección)
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.
- Dolor de cabeza intenso.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

CONSERVACIÓN

- Conservar en el envase original a temperatura ambiente.
- Proteger de la luz y la humedad (guardar en un lugar seco).

CADUCIDAD

- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Esta medicación puede adquirirse únicamente en el servicio de Farmacia Hospitalaria de su hospital con la receta que le hará su médico especialista.

REFERENCIAS

- Ficha técnica del Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS-CIMA

Programa de Información al Paciente Pediátrico v Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

[base de datos en Internet]. Madrid, España: Agencia española de medicamentos y productos sanitarios (AEMPS). Disponible en:

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000687/WC500057737.pdf

- Micromedex Healthcare® Series [base de datos en Internet]. Greenwood Village, Colorado: Thomson MICROMEDEX DRUGDEX® System. 1974-2012. Disponible en: <http://www.thomsonhc.com/home/dispatch> Drugdex ® de Thomson Micromedex ® Healthcare Series.
- UpToDate (Pediatric drug information), base de datos de internet. (última fecha de acceso Nov.2013). Disponible www.uptodate.com

FECHA DE ELABORACIÓN/ FECHA DE REVISION

Noviembre 2013/Febrero 2014