

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)



TARCEVA® 150 mg (Erlotinib)

Comprimidos recubiertos con película 150 mg
Caja con 30 comprimidos

Conservación: Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.



POSOLOGIA

- Erlotinib comprimidos se administrará por vía oral.
- Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la frecuencia.

¿CÓMO se debe TOMAR ERLOTINIB comprimidos?

- Erlotinib comprimidos debe tomarse sin alimentos, al menos una hora antes o dos horas después de las comidas.
- Mantenga siempre el mismo horario.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Si se requiere partir el comprimido, debe leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.

¿QUÉ hacer si.....?

- Si ha olvidado una dosis, adminístrela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no tome la dosis olvidada (nunca doble la dosis).
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de media hora desde la toma
- Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Instituto Nacional de Toxicológica (Tfno: 91 562 04 20).
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar Erlotinib?

- Si es alérgico a Erlotinib, así como a alguno de los componentes del comprimido.
- Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

PRECAUCIONES

- Tenga especial precaución si está en tratamiento con inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, pantoprazol) o antagonistas H2 (ranitidina). Tome los protectores gástricos 4 horas antes o 2 horas después de tomar Erlotinib.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.
- Se recomienda usar gel de baño sin detergente, cremas hidratantes de avena o aloe vera y champú suave.
- Protéjase del sol con ropa adecuada y crema con filtro solar de protección superior a 15.
- Tome 2 medidas anticonceptivas para evitar un embarazo durante el periodo de tratamiento.

INTERACCIONES

- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.
- Erlotinib comprimidos puede interactuar con antifúngicos (ketoconazol, itraconazol, voriconazol), antibióticos (eritromicina, claritromicina, rifampicina), antivirales (atazanavir, indinavir, nefazodona, nelfinavir, ritonavir, saquinavir), antiepilépticos (fenobarbital, carbamazepina, fenitoína), anticoagulantes (warfarina, acenocumarol), Hierba de San Juan o hipérico, Zumo de Pomelo.

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante la toma de Erlotinib (que no significa que aparezcan en todos los pacientes) son:

- Diarrea.
- Náuseas y vómitos.
- Enrojecimiento y sequedad de la piel, picor.
- Dificultad para respirar. Tos.
- Mayor susceptibilidad de padecer infecciones.
- Dolor, enrojecimiento o llagas en la boca.
- Fatiga, cansancio.
- Pérdida de peso.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Erupción cutánea grave con formación de ampollas, descamación de la piel, fiebre
- Dificultad para respirar
- Dolor e inflamación de piernas., especialmente en la parte inferior y pantorrilla
- Fiebre alta > 38 °C, escalofríos (signos de infección)
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

CONSERVACIÓN

- Conservar en el envase original a temperatura ambiente.
- Proteger de la luz y la humedad (guardar en un lugar seco).

CADUCIDAD

- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

- Esta medicación sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de su Centro.

REFERENCIAS

- Ficha técnica del Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS-CIMA [base de datos en Internet]. Madrid, España: Agencia española de medicamentos y productos sanitarios(AEMPS). Disponible en: http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000618/WC500033994.pdf
Consultado el 9 de noviembre de 2013.
- Micromedex 2.0 [base de datos en Internet]. MICROMEDEX DRUGDEX® System. 2012-2013 Truven Health Analytics Inc. Disponible en: <http://www.micromedexsolutions.com/home/dispatch>. Consultado el 9 de noviembre de 2013.
- UptoDate®. (Base de datos en internet).Drug Information Lexicomp®. Wolters Kluwer Health Clinical Solutions 2013. Disponible en: <http://www.uptodate.com>. Consultado el 9 de noviembre de 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN/ FECHA DE REVISION

Noviembre 2013/Enero 2014