

## Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)  
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)  
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)



Sociedad Española  
de Farmacia Hospitalaria



### Tioguanina Aspen® 40 mg (Tioguanina)

Comprimidos 40 mg

Caja con 25 comprimidos

Conservación: Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.



### POSOLOGIA

- Tioguanina comprimidos se administrará por vía oral.
- Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la frecuencia.

### ¿CÓMO se debe TOMAR TIOGUANINA comprimidos?

- Tioguanina comprimidos debe administrarse preferiblemente con el estómago vacío. una hora antes o dos horas después de las comidas. Tomar el comprimido con abundante agua. No mezclar con productos lácteos ni con bebidas calientes. Durante el tratamiento y salvo que su médico indique lo contrario, debe beber abundante cantidad de agua y líquidos.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolverlos.
- Mantenga siempre el mismo horario.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Si se requiere partir el comprimido, debe leer y seguir cuidadosamente las instrucciones generales de manejo de citostáticos orales.

### ¿QUÉ hacer si.....?

- Si ha olvidado una dosis, adminístrela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no tome la dosis olvidada (nunca doble la dosis).
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de media hora desde la toma.
- Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Instituto Nacional de Toxicología (Teléfono: 91 562 04 20).
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

### ¿Cuándo NO debe tomar Tioguanina?

- Si es alérgico a Mercaptopurina o Tioguanina, así como a alguno de los componentes

## Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)  
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)  
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

del comprimido.

- Si ha presentado resistencia a un tratamiento previo con tioguanina o mercaptopurina.
- Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con el antes de tomar este medicamento.

### PRECAUCIONES

- Si tiene una enfermedad hepática.
- Si tiene una enfermedad renal.
- Si ha tenido cálculos renales de uratos.
- Si ha sufrido alguna enfermedad que afecte de manera importante a la absorción intestinal.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

### INTERACCIONES

- Tioguanina comprimidos puede interactuar con alopurinol, busulfano, carbamacepina, gentamicina y derivados de los aminosalicilatos.
- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.

### EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante la toma de Tioguanina (que no significa que aparezcan en todos los pacientes) son:

- Náuseas y vómitos.
- Cansancio.
- Falta de apetito. Debilidad.
- Llagas en la boca.
- Erupción cutánea (puede empeorar con la exposición al sol).
- Alteraciones del hígado con coloración amarillenta de los ojos o la piel.
- Orina oscura.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias (sangrado), tenga cuidado con utensilios que corten.

#### Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel (reacción alérgica grave)
- Fiebre alta > 38 °C, escalofríos (signos de infección)
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

### CONSERVACIÓN

- Conservar en el envase original a temperatura ambiente.
- Proteger de la luz y la humedad (guardar en un lugar seco).

### CADUCIDAD

- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

### ADVERTENCIAS

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Esta medicación puede adquirirse en las Oficinas de Farmacia, con la receta que le

## **Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral**

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)  
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)  
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

hará su médico especialista.

### **REFERENCIAS**

- Ficha técnica del Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS-CIMA [base de datos en Internet]. Madrid, España: Agencia española de medicamentos y productos sanitarios(AEMPS). Disponible en:  
<https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm>
- Micromedex Healthcare® Series [base de datos en Internet]. Greenwood Village, Colorado: Thomson MICROMEDEX DRUGDEX® System. 1974-2012. Disponible en:  
<http://www.thomsonhc.com/home/dispatch> Drugdex ® de Thomson Micromedex ® Healthcare Series.
- Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Catálogo de Medicamentos 2013. Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
- Taketomo CK, Hodding JH, Kraus DM. Pediatric and Neonatal Dosage Handbook. 18 th ed. American Pharmacists Association, editor. Hudson (OH): Lexi Com; 2011.

### **FECHA DE ELABORACIÓN/ FECHA DE REVISION**

Octubre 2013/Febrero 2014