FIBRINÓGENO (RIASTAP®)

INDICACIONES

Tratamiento de hemorragias en pacientes con **hipo o afibrinogenemia congénita** con tendencia al sangrado.

POSOLOGÍA

- Si **no** se conoce el nivel de fibrinógeno: **70 mg/kg.**
- Si se conoce el nivel de fibrinógeno:

$$\text{Dosis (mg/kg)} = \frac{[\text{Nivel objetivo (g/l)} - \text{nivel medido (g/l)}]}{0{,}017 \text{ (g/l por mg/kg)}}$$

Hasta alcanzar

NIVELES PLASMÁTICOS OBJETIVO

Casos leves: 1 g/l durante tres días.

Casos graves: 1,5 g/l durante siete días.

CONSERVACIÓN

Tras su reconstitución, no conservar **> 8h a Tª ambiente (< 25ºC).**

Vial sin reconstituir: **entre 2 ºC - 8 ºC** .

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de sus excipientes.

REACCIONES ADVERSAS

Trombosis y complicaciones tromboembólicas.

Reacciones alérgicas y anafilácticas.

gemeh
Grupo de trabajo Español de Medicamentos Hemoderivados de la sefh

sefh
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria

FIBRINÓGENO (RIASTAP®)

RECONSTITUCIÓN

Atemperar y reconstituir el vial de Riastap® con 50 mL de agua para preparaciones inyectables. **Se obtendrá una concentración de 20 mg/mL.**

Agitar suavemente hasta su completa reconstitución, evitar la formación de espuma.

ADMINISTRACIÓN

Inserte el punzón de aspiración Mini-Spike® en el tapón del vial con el producto reconstituido.

Enrosque la jeringa **en el filtro de jeringa Pall®** proporcionado.

Enrosque la jeringa con el filtro montado **en el punzón de aspiración.**

Aspire el producto reconstituido dentro de la jeringa y **adminístrelo inmediatamente.**

MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN

Perfusión o inyección **INTRAVENOSA** a una **velocidad máxima de 5 ml/min** (reconstitución sin dilución).

HEMODERIVADOS

¡REGISTRAR EL LOTE PARA MANTENER LA TRAZABILIDAD!

gemeh
Grupo de trabajo Español de Medicamentos Hemoderivados de la sefh

sefh
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria