



## EFFECTIVIDAD DE LOS NUEVOS ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA EN EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C CRÓNICA EN PACIENTES PRETRATADOS

Laguna Mármol L., Padrón García MA., Piñero González M., Varela González M.,  
Morales León V.  
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria

### Objetivos

Evaluar los resultados de efectividad de los nuevos antivirales de acción directa (AAD) en el tratamiento de la hepatitis C (VHC) en pacientes tratados previamente.

### Métodos

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de los pacientes con VHC que habían recibido tratamiento previo y que finalizaron tratamiento con AAD antes de Febrero de 2016. De los datos obtenidos de la historia clínica electrónica y una base de datos del Servicio de Farmacia, se seleccionó a los pacientes pretratados, analizándose las variables: genotipo, grado de fibrosis, coinfección VIH, tratamiento previo, tratamiento con AAD, carga viral al finalizar tratamiento (CVFT) y a 12 semanas (RVS12).

### Resultados

De 250 pacientes con tratamiento finalizado, 160 (64%) fueron pretratados, 146 con interferón-ribavirina y 14 con IP 1ª generación (Boceprevir/Telaprevir). Diecisiete pacientes presentan co-infección VIH. La distribución de pacientes según genotipo (G) fue: 15 (9,37%) G4, 14 (8,7%) G3, 4 (2,5%) G1 sin subtipar, 39(24,37%) G1a y 88 (55%) G1b. Según el grado de fibrosis (F): 1 (0,62%) F0, 8 (5%) F1, 34 (21,25%) F2, 35 (21,87%) F3 y 82 (51,25%) F4.

Siguiendo las recomendaciones de las Guías de práctica clínica y el Plan Estratégico del SNS, se utilizaron 11 combinaciones de ADD (Daclatasvir, Ledipasvir, Sofosbuvir, Dasabuvir, Ombitasvir, Paritaprevir/r, Simeprevir) ribavirina y peg-interferón. La CVFT fue indetectable en el 100% de los pacientes. Se dispone de datos a 12 semanas de 121 pacientes, 117 (96,7%) presentaron RVS12. Los 4 (3,3%) pacientes que fracasaron fueron pretratados con INF-RBV, 2 tenían G1b F4, 1 era G1a F4 y 1 era G3 F2.

### Conclusiones

La efectividad de AAD en pacientes pretratados en la práctica clínica entra dentro de los porcentajes presentados en los ensayos clínicos.

Los fallos al tratamiento son escasos para concluir asociaciones significativas con las variables estudiadas.

Todos los pacientes que fallaron, fueron recaídas tras CVFT indetectable.