



## EFFECTIVIDAD DE DACLATASVIR + SOFOSBUVIR ± RIBAVIRINA EN PACIENTES TRASPLANTADOS HEPÁTICOS REINFECTADOS POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C

Gallardo Lavado MM., Prada Lobato J., Rodríguez Barbero J., Olmo Revuelto A.,  
Sánchez González JL.  
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

### Objetivo

Describir la efectividad de daclatasvir (uso compasivo) + sofosbuvir ± ribavirina en la reinfección por el Virus de Hepatitis C (VHC) en pacientes trasplantados hepáticos. Analizar la adherencia al tratamiento.

### Métodos

Estudio observacional retrospectivo en el que se incluyeron los pacientes trasplantados hepáticos con reinfección por el VHC tratados con daclatasvir (uso compasivo) + sofosbuvir ± ribavirina desde octubre de 2014 hasta julio de 2015. Se registraron las siguientes variables: sexo, fibrosis hepática, genotipo (G), ILB28, respuesta al tratamiento previo y carga viral basal (CVb). Se definió efectividad como Respuesta Viral Sostenida (RVS) 12 semanas después de finalizar el tratamiento. La adherencia se calculó para cada medicamento con los datos de dispensaciones registrados en el módulo de pacientes externos del programa Farmatools® según la fórmula: % adherencia= nº unidades galénicas totales dispensadas / nº unidades galénicas totales previstas x 100.

### Resultados

Se incluyeron 13 pacientes (11 hombres y 2 mujeres). Los pacientes fueron tratados durante 24 semanas con sofosbuvir + daclatasvir. En dos de ellos, además, se incluyó ribavirina en el tratamiento. El grado de fibrosis: 7/13 F4, 4/13 F1 y 2/13 hepatitis colestásica fibrosante; Genotipo: 9/13 G1 (7/9 G1b, 2/9 G1a), 4/13 G4; ILB28: 5/13 CT, 2/13 TT y 6/13 desconocida. Respuesta al tratamiento previo: 6/13 respondedores nulos, 3/13 naive, 2/13 recidivantes, 2/13 interrupción por efectos adversos; CVb media = 495098 UI/ml (DE = 3274547) con un rango de 1119 – 10642834 UI/ml. Todos los pacientes presentaron RVS la semana 12. En 13/13 pacientes la adherencia a todos los medicamentos fue del 100%.

### Conclusiones

sofosbuvir + daclatasvir ± ribavirina es un esquema muy eficaz en pacientes con reinfección por el VHC trasplantados hepáticos, con una adherencia al tratamiento perfecta.