



**EFICACIA EVALUADA COMO RESPUESTA VIRAL SOSTENIDA A LA SEMANA 12 DE  
HABER FINALIZADO EL TRATAMIENTO CON NUEVOS ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA  
(AAD) EN PACIENTES CON VRIUS HEPATITIS C CRÓNICA**

**Tortajada Esteban EV., Bécares Martínez FJ., Arias Moya MA  
Hospital Fundación Jiménez Díaz. Madrid**

**Objetivos**

Eficacia evaluada como respuesta viral sostenida a la semana 12 de haber finalizado el tratamiento en pacientes con VHC que han iniciado tratamiento con AAD bajo el marco del Plan Estratégico Nacional para el abordaje de la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos pacientes.

**Material y Método**

1. Implantación de circuito de llamada y visita médica no presencial a los pacientes F4, pasándoles un cuestionario. Se inició tratamiento tempranamente ya que los pacientes no tuvieron que esperar a una nueva cita de revisión con el médico, sino que se les citó como 1ª visita de Atención Farmacéutica.
2. Revisión de los registros de todos los pacientes que han iniciado tratamiento del VHC a partir del 1/4/16 hasta el 31/01/2016.

**Resultados**

El desarrollo multidisciplinar de un circuito de llamada a los pacientes F4 permitió iniciar tratamiento en el mes de abril a 83 pacientes. Entre abril y junio lo hicieron 255 pacientes: 61.9% (158) F4 y 21,9% (56) F3. En el periodo de estudio han iniciado tratamiento con AAD un total de 437 pacientes (259 hombres y 215 mujeres).

	PACIENTES TRATADOS (437)S	TRATAMIENTOS FINALIZADOS (329)	CV=ND AL FINAL DEL TTO (321)	RVS A LAS 12 SEMANAS (203)
VIEKIRAX/EXVIERA	184	141	137	105
HARVONI	185	144	141	72
VIEKIRAX+RIBAVIRINA	11	6	6	5
SOVALDI/DALINZA	16	11	11	7
SOVALDI/RIBAVIRINA	14	4	4	1
SOVALDI/OLYSIO	14	12	12	6
OLYSIO/DAKLINZA	5	3	3	1
OLYSIO/PEGINTERFERON/RIBAVIRINA	7	7	6	6
SOVALDI/PEGINTERFERON/RIBAVIRINA	1	1	1	0



Sociedad Española de  
Farmacia Hospitalaria

GHEVI



A 31 de Enero de 2016, 329 pacientes (75,28%) habían finalizado el tratamiento. El 97,5% con carga viral no detectable al final del tratamiento. Se pudo obtener el datos de carga viral a la semana 12 en 203 pacientes, el 100% con respuesta viral sostenida.

### **Conclusiones**

Podemos afirmar que en la práctica clínica real, los datos de efectividad a las 12 semanas de haber finalizado el tratamiento se asemejan a los publicados en los EECC, superando el 97%. Se entrevé una solución a una enfermedad que presentaba unos índices de curación del 50%, obteniéndose un gran avance en medicina pero desgraciadamente con un gran impacto económico que no permite tratar a la población mundial.