


ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

Fármacos biológicos - embarazo y lactancia




Fármaco	Vía admin.	Dosis y esquema	Embarazo	Lactancia	¿Cuándo suspender el tratamiento?
Infliximab	Intravenosa	<i>Inducción:</i> 5 mg/Kg a las 0, 2 y 6 semanas. <i>Mantenimiento:</i> cada 8 semanas.	Precauciones de empleo. Atraviesa la placenta a partir del tercer trimestre.	Uso seguro	Hasta la semana 30 de embarazo
	Subcutánea	120 mg cada 2 semanas.*			
Adalimumab	Subcutánea	<i>Inducción:</i> 160/80 a las 0 y 2 semanas. <i>Mantenimiento:</i> 40 mg cada 2 semanas.	Precauciones de empleo. Atraviesa la placenta a partir del tercer trimestre.	Uso seguro	20-24 semanas de embarazo
Golimumab	Subcutánea	<i>Inducción:</i> 200/100 mg a las 0 y 2 semanas. <i>Mantenimiento:</i> Si <80 Kg: 50 mg cada 4 semanas. Si >80 Kg: 100 mg cada 4 semanas.	Precauciones de empleo. Atraviesa la placenta a partir del tercer trimestre.	Las mujeres no deben dar el pecho durante y al menos 6 meses después del tratamiento	Datos disponibles escasos; posiblemente seguro en primer trimestre
Vedolizumab	Intravenosa	<i>Inducción:</i> 300 mg a las 0, 2 y 6 semanas. <i>Mantenimiento:</i> 300 mg cada 8 semanas.	Datos limitados. Preferible evitar en embarazo	Datos limitados. Probablemente seguro	Métodos anticonceptivos y continuar su uso 18 semanas tras última dosis. Posiblemente seguro hasta semana 30-32
Ustekinumab	Subcutánea	<i>Inducción:</i> <55 Kg: 260 mg IV. 55-85 Kg: 390 mg IV. >85 Kg: 520 mg IV. <i>Mantenimiento:</i> 90 mg/subcutáneo cada 8/12 semanas.	No hay datos suficientes. Preferible evitar en embarazo	Datos limitados	Posiblemente seguro (hasta 8-10 semanas antes del parto), pero por limitación de datos se recomienda no usar durante el embarazo
Tofacitinib	Oral	<i>Inducción:</i> 10 mg cada 12 horas 8 semanas. <i>Mantenimiento:</i> 5 mg cada 12 horas.	Contraindicado	Contraindicado	Métodos anticonceptivos efectivos durante tratamiento y hasta 4-8 semanas tras fin tratamiento

* la primera dosis subcutánea será 4 semanas después de la última administración de dos perfusiones intravenosas de 5 mg/kg de infliximab administradas con 2 semanas de diferencia. IV: intravenoso

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

Fármacos biológicos - embarazo y lactancia



Más información:

