


Algunos **fármacos** de uso habitual que requieren ajuste de dosis en pacientes con

# ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

## Antiinflamatorios

	Dosis normal	FG 100-50 ml/min	FG 50-10 ml/min	FG <10 ml/min
Celecoxib	200 mg/24 h	100-75%	75-50%. Evitar con FG <30 ml/min	Evitar
Clonixinato de lisina	125-250 mg/6-8 h	100%	75-50%	Evitar
Dexketoprofeno	12,5-25 mg/8 h	100-75%	75-50%	Evitar
Diclofenaco	50 mg/8-12 h	100%	75-50%	Evitar
Etoricoxib	30-60 mg/24 h	100%	Evitar con FG < 30 ml/min	Evitar
Flurbiprofeno	8,75 mg/6 h	100%	100%	Evitar
Ibuprofeno	600 mg/6-8 h	100%	75-50%	Evitar
Indometacina	25-50 mg/8-12 h	100%	50%	Evitar
Ketoprofeno	50 mg/8-12 h	100%	75-50%	Evitar
Naproxeno	550 mg/12-24 h	100-75%	75-50%. Evitar con FG <30 ml/min	Evitar
Parecoxib (IM o IV)	40 mg/24 h	100%	75-50%	50%
Piroxicam	20 mg/día	100%	75-50%	Evitar
Sulindaco	200-400 mg/día	100%	100-75%	50%




Algunos **fármacos** de uso habitual que requieren ajuste de dosis en pacientes con

# ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

## Analgésicos y opioides

	Dosis normal	FG 100-50 ml/min	FG 50-10 ml/min	FG <10 ml/min
Buprenorfina (parches TD)	35-70 mcg/h (cambio 2 golpes por semana)	100%	100%	100%
Codeína	10-20 mg/4-6 h (máximo 120 mg/24h)	100%	75%	50%
Dextrometorfano	30 mg/6-8 h (máximo 120 mg/24 h)	100%	100%	Evitar
Erenumab	70-140 mg/4 semanas	100%	100%. No datos con ClCr <30 ml/min	No datos
Fentanilo	200 mg/día (titular dosis)	100%	75%	50%
Gacanezumab	240 mg dosifique de carga. 120 mg/4 semanas	100%	100%. No datos con ClCr <30 ml/min	No datos
Meperidina o petidina (IM o IV)	25-100 mg/4 h	100%	50%	Evitar
Metamizol	575 mg/6-8 h	100%	100%	100%
Morfina	10 mg/4h (titular dosis)	100%	75%	50%
Oxicodona	10 mg/12 h (titular dosis)	Iniciar con <50% de dosis y titular		
Paracetamol	0,5-1 g/6-8 h	0,5-1 g/6-8 h	500 mg/6 h	500 mg/8 h
Tramadol	50-100 mg/6-8 h	Cada 8h	Cada 12 h	Evitar




Algunos **fármacos** de uso habitual que requieren ajuste de dosis en pacientes con

# ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

## Diuréticos

	Dosis normal	FG 100-50 ml/min	FG 50-10 ml/min	FG <10 ml/min
Amilorida	5 mg/24 h	100%	50%	Evitar
Bumetanida	0,5-10 mg/24 h	100%	100%	100%
Clortalidona	12,5-50 mg/24 h	100%	Evitar si ClCr <30 ml/min	Evitar
Eplerenona	25-50 mg/24 h	100%	Evitar	Evitar
Espiro lactona	50-100 mg/24 h	Cada 6-12 h	Cada 12-24 h	Evitar
Furosemida	20-40 mg/24-8 h	100%	100%	100%
Indapamida	1,25-5 mg/24 h	100%	Evitar si ClCr <30 ml/min	Evitar
Tiazidas	25-50 mg/24 h	100%	100%	Evitar
Tolvaptán	15-120 mg/24 h	100%	100%	Evitar
Torasemida	2,5-10 mg/24 h	100%	100%	100%
Triamtereno	50-100 mg/24 h	100%	100%	Evitar



# Algunos **fármacos** de uso habitual que requieren ajuste de dosis en pacientes con **ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA**

## Betabloqueantes

	Dosis normal	FG 100-50 ml/min	FG 50-10 ml/min	FG <10 ml/min
Atenolol	5-100 mg/24 h	100%	50%	25%
Bisoprolol	10 mg/24 h	100%	75%	50%
Carvedilol	12,5-50 mg/día	100%	100%	100%
Celiprolol	200-400 mg/24 h	100%	75-50%	Evitar
Labetalol	100-200 mg/12 h	100%	100%	100%
Metoprolol	100-200 mg/24 h (1 o 2 tomas)	100%	100%	100%
Nadolol	40-80 mg/24 h	100%	50%	25%
Propranolol	40 mg/8-12 h	100%	75-50%	50%

## Bloqueantes alfa 1


Doxazosina	1-8 mg/24 h	100%	100%	100%
Prazosina	1-10 mg/24 h	100%	100%	100%
Terazosina	2-5 mg/24 h	100%	100%	100%

## Otros antiadrenérgicos periféricos

Urapidil	25 mg IV de inicio	100%	100%	100%
----------	--------------------	------	------	------

## Antiadrenérgicos centrales

Clonidina	0,3-1,2 mg/día (2-4 tomas)	100%	75%	50%
Metildopa	250-1000 mg/12 h	Cada 12 h	Cada 12 h	Cada 24 h
Moxonidina	0,2-0,6 mg/día (2 tomas)	0,2-0,6 mg/día (2 tomas)	0,2-0,4 mg/24 h	0,2 mg/24 h



Algunos **fármacos** de uso habitual que requieren ajuste de dosis en pacientes con

# ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

*Inhibidores ECA y ARA-II*

	<b>Dosis normal</b>	<b>FG 100-50 ml/min</b>	<b>FG 50-10 ml/min</b>	<b>FG &lt;10 ml/min</b>
Benazepril	10 mg/24 h	100%	75-50%	50-25%
Candesartán	8-32 mg/24 h	100%	100%	50%
Captopril	25 mg/8 h	100%	75%	50%
Enalapril	5-10 mg/12 h	100%	75-100%	50%
Eprosartán	600-800 mg/24 h	100%	600 mg/24 h	600 mg/24 h
Fosinopril	10 mg/24 h	100%	100%	75-100%
Irbesartán	75-300 mg/24 h	100%	100%	100%
Lisinopril	2-20 mg/24 h	5-10mg/24 h	2,5-5 mg/24 h	2,5 mg/24 h
Losartán	12,5-150 mg/24 h	100%	100%	100%
Olmesartán	10-40 mg/24 h	100%. Si ClCr <60 ml/min: 20 mg/24 h	Si ClCr <60 ml/min: 20 mg/24 h	Evitar
Perindopril	5-10 mg/24h	5 mg/24 h	2,5 mg/24 h. Si ClCr <30 ml/min: Cada 48 h	2,5 mg/48 h
Quinapril	10-20 mg/24 h	100%	75-100%	75%
Ramipril	5-10 mg/24 h	100%	75-50%	50-25%
Sacubitril-Valsartán	24/26-49/51-97/103 mg/12 h	100%	24-26 mg/12 h	Evitar
Telmisartán	20-80 mg/24 h	100%	20 mg/24 h	20 mg/24 h
Trandolapril	0,5-2 mg/24 h	0,5-2 mg/24 h	Si ClCr <30 ml/min: 0,5 mg/24 h	0,5 mg/24 h
Valsartán	80-320mg/24 h	100%	100%	Evitar