


DISFAGIA Y MEDICAMENTOS

En principio, todos los medicamentos deben ser administrados sin manipular pero **en muchas ocasiones no existen formas farmacéuticas alternativas** que permitan su administración a personas con **trastornos de la deglución (disfagia)**

Comprimidos que se pueden triturar: machacar hasta polvo fino y administrarlos con agua espesada o con una cucharada de algún alimento con textura de puré (yogur, etc).

Fórmulas líquidas: deben poder ser espesadas a viscosidad necesaria




NO TRITURAR en ningún caso:



Formas farmacéuticas de **liberación retardada/controlada/sostenida/modificada**

Su cubierta especial permite, una vez dentro del organismo, liberar lentamente el fármaco. Si se trituran desaparece esta cubierta y, se libera todo el contenido del comprimido, lo que puede desencadenar intoxicaciones graves en algunos casos



Formas farmacéuticas de **cubierta entérica o gastrorresistente**

Esta cubierta se utiliza en medicamentos que no resisten la acidez del estómago, porque pueden irritar el estómago o porque su inicio de acción se debe hacer en el intestino




Comprimidos sublinguales

Se absorben bajo la lengua sin necesidad de tragarlos por lo que no es necesario triturarlos



Comprimidos efervescentes

Se disuelven fácilmente con una pequeña cantidad de agua (20 ml) sin triturarlas




Cápsulas con microesferas, microgránulos o pellets

Microgránulos no se pueden triturar, aunque sí se puede vaciar cápsula y tragar microgránulos enteros con agua gelificada


DISFAGIA Y MEDICAMENTOS

Selección de la forma farmacéutica y técnicas de manipulación:



DISFAGIA Y MEDICAMENTOS

Más información



DEGLUFARM

