

Indicaciones para profesionales sanitarios tras el estudio beneficio-riesgo de QUINOLONAS Y FLUOROQUINOLONAS

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)



Especial PRECAUCIÓN en:

- **edad avanzada**
- **insuficiencia renal**
- **trasplantes de órganos sólidos**
- **evitar el uso concomitante de corticosteroides con fluoroquinolona**



Parar el tratamiento y acudir al médico si:

síntomas sugestivos de una **reacción adversa grave**, como por ej:

- tendinitis
- rotura tendinosa
- mialgia
- debilidad muscular
- dolor y/o tumefacción articular
- neuropatía periférica
- efectos sobre el SNC



Retirada del mercado:

- **cinoxacina** (no disponible en España)
- **flumequina** (no disponible en España)
- **ácido nalidíxico** (no disponible en España)
- **ácido pipemídico**



NO prescribir en:

- **infecciones autolimitadas o leves** (como faringitis, amigdalitis y bronquitis aguda)
- **profilaxis de la diarrea del viajero o de las infecciones recurrentes de las vías urinarias bajas**
- **infecciones no bacterianas**, por ej, prostatitis no bacteriana (crónica)
- **infecciones de leves a moderadas** (cistitis no complicadas, exacerbaciones agudas de la bronquitis crónica y la EPOC, rinosinusitis bacteriana aguda y otitis media aguda)
- **antecedentes de reacciones adversas graves** tras la administración de este tipo de antibióticos

