

INFUSORES ELASTOMÉRICOS


¿Sabes para qué sirven?



¿En qué consisten?



Son dispositivos que permiten la administración continua o intermitente de medicamentos vía **intravenosa/subcutánea** de forma controlada en el **domicilio** del paciente



Son un recipiente plástico rígido y transparente en cuyo interior se encuentra un globo o deposito elastomérico en el que se introduce la medicación a infundir. El globo distendido ejerce una presión constante y **fuerza al medicamento a través del tubo de infusión hacia el catéter del paciente**

¿Cuándo se usan?



Pacientes oncológicos:

tanto en la administración de tratamiento **analgésico** y de control de **síntomas** como para administrar **quimioterapia** intravenosa

Pacientes en cuidados paliativos:


los infusores permiten el control eficaz de los múltiples síntomas que pueden presentar los pacientes en fase terminal

Terapia del dolor:


dolor crónico a causa de procesos neuropáticos y degenerativos, y también en **dolor agudo** postoperatorio o de origen traumático

Pacientes con terapia antiinfecciosa

Algunas recomendaciones



- Conservar los elastómeros en la **nevera**
- Almacenar en un **compartimento separado de la nevera** y alejado de todo aquello que pudiera dañarlo, como objetos punzantes
- **No colocar nada encima** de los elastómeros



- Puede **realizar las actividades habituales (caminar, conducir, etc)**, mientras lleve el infusor conectado pero debe evitar actividades extremas hasta que la infusión haya finalizado
- Asegúrese que el **clamp permanece abierto** mientras recibe el tratamiento

Algunas recomendaciones



- Puede **ducharse**. El infusor puede mojarse, pero no puede sumergirse en agua. Puede mantenerlo en la bolsa de plástico



- El infusor debe mantenerse al mismo nivel que el final de la línea de infusión. Por eso, **mientras duerme**, evite colocar el infusor en el suelo o colgando sobre su cabeza. Puede resultarle cómodo situar el infusor bajo la almohada

Signos de alarma: consulte con su equipo de Hospitalización a Domicilio



Fiebre

Enrojecimiento, calor o dolor en la zona de la **vía** venosa

Dolor en el brazo o en el cuello

El **elastómero** no se desinfla o pierde líquido o gotea

O el **catéter** se ha movido



Tiene dudas sobre la **medicación** que ha de tomar o el **horario** de la misma

Presenta un **“nuevo síntoma”** de forma repentina que no haya indicado previamente a los miembros del equipo de **Hospitalización a Domicilio**