

DIFERENCIAS IMPORTANTES ENTRE PRESENTACIONES DE (COMIRNATY®)

VACUNA COVID-19 DE PFIZER/BIONTECH



5 a 11 años



Cápsula vial: naranja

Sí (con NaCl 0,9%)

1,3 ml por vial

10 dosis por vial

10 ug por dosis

0,2 ml por dosis



12 años o +



Cápsula vial: morada

Sí (con NaCl 0,9%)

1,8 ml por vial

6 dosis por vial

30 ug por dosis

0,3 ml por dosis

¿Diluir?

Cantidad diluyente

Nº dosis tras diluir

Dosis individual

Volumen individual

Almacenamiento

De -90 °C a -60 °C

De -25 °C a -15 °C

De 2 a 8°C

De 8 a 30°C

Estabilidad tras la dilución (2 a 30°C)

6 meses

no almacenar a esa T^a

10 semanas

12 horas (vial sin abrir)

12 horas

9 meses

2 semanas


1 mes

2 horas (vial sin abrir)

6 horas

La vacuna COVID-19 de ≥ 12 años **NUNCA** usarse para niños de 5 a 11 años

¿Cómo minimizar el riesgo de equivocación entre la presentación pediátrica y la de mayores de 12 años?



Almacenamiento en congeladores/neveras debidamente organizados y etiquetados.

Guardar las diferentes presentaciones separadas unas de otras



Etiquetar claramente todas las jeringas individuales

Para facilitar etiquetado adecuado, se puede imprimir etiquetas para cada paciente o proporcionar etiquetas preimpresas que diferencian las dosis para adultos y pediátricas. Idealmente, escaneo de códigos de barras para confirmar la vacuna correcta antes de administración



Identificar correctamente al paciente preguntando a él o a padres: nombre completo, fecha de nacimiento y edad



En el momento de la vacunación **tener solo un tipo de vacuna disponible**



Involucrar a padres o al paciente en la verificación de la vacuna leyendo la etiqueta para confirmar que es la vacuna correcta